

**Вид:** Капуста цвітна *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *botrytis*

**Заявка №** 11029007 **Назва сорту:** Абені

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:**

**Патент №**

**Дата пріоритету:** 30.11.2011

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:**

15.02.2016

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 160304

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Сіянець: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: за висотою (за збирання)	середня	5
3	Зовнішнє стебло: за довжиною (до місця прикріплення першого листка)	коротке	3
4	Листок: положення	напівпрямий	3
5	Листок: за довжиною	дуже короткий	1
6	Листок: за шириною	дуже вузький	1
7	Листок: відношення ширина/довжина	середнє	5
8	Листок: часточковість	відсутня	1
9	Листок: забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	сіро-зелене	2
10	Листок: інтенсивність забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	світле	3
11	Листок: закручування верхівки	відсутнє або дуже слабке	1
12	Листок: форма поперечного перерізу	увігнута	1
13	Листок: пухирчатість	відсутня або дуже слабка	1
14	Листок: зморшкуватість біля головної жилки	відсутня або дуже слабка	1
15	Листок: хвилястість краю	слабка	3
16	Головка: покриття внутрішніми листками	відкрита	1
17	Головка: за висотою	низька	3
18	Головка: за діаметром	мала	3
19	Головка: форма поздовжнього розрізу	вузько-еліптична	4
20	За винятком сортів з трикутною головою: Головка: утворення склепіння	слабке	3
21	Головка: забарвлення	жовте	2
22	Головка: горбкуватість	сильна	7
23	Головка: текстура	груба	7
24	Головка: антоціанове забарвлення після збиральної стиглості	наявне	9
25	Квітка: забарвлення	біле	1
26	Час досягання за весняного садіння	середній	5
27	Час досягання за літнього садіння	ознака не визначалась	0
28	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність – 32 т/га, товарна врожайність – 27 т/га, період від повних сходів до початку досягання – 70 діб, період плодоношення – 20 діб, вміст білка – 2,3 %, вміст вітаміну С – 58 мг%, вміст сухої речовини – 8,8 %.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** Степ, Лісостеп, Полісся.