

Вид: Капуста цвітна *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *botrytis*

Заявка № 13101007 **Назва сорту:** Кліпер

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

11.02.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160097

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|--|--------------------------|-----|
| 1 | Сіянець: антоціанове забарвлення гіпокотила | наявне | 9 |
| 2 | Рослина: за висотою (за збирання) | середня | 5 |
| 3 | Зовнішнє стебло: за довжиною (до місця прикріплення першого листка) | коротке | 3 |
| 4 | Листок: положення | напівпрямий | 3 |
| 5 | Листок: за довжиною | короткий | 3 |
| 6 | Листок: за шириною | середній | 5 |
| 7 | Листок: відношення ширина/довжина | середнє | 5 |
| 8 | Листок: часточковість | відсутня | 1 |
| 9 | Листок: забарвлення (з восковим нальотом, якщо є) | сіро-зелене | 2 |
| 10 | Листок: інтенсивність забарвлення (з восковим нальотом, якщо є) | помірне | 5 |
| 11 | Листок: закручування верхівки | відсутнє або дуже слабке | 1 |
| 12 | Листок: форма поперечного перерізу | увігнута | 1 |
| 13 | Листок: пухирчатість | слабка | 3 |
| 14 | Листок: зморшкуватість біля головної жилки | відсутня або дуже слабка | 1 |
| 15 | Листок: хвилястість краю | слабка | 3 |
| 16 | Головка: покриття внутрішніми листками | відкрита | 1 |
| 17 | Головка: за висотою | низька | 3 |
| 18 | Головка: за діаметром | мала | 3 |
| 19 | Головка: форма поздовжнього розрізу | широко-еліптична | 2 |
| 20 | За винятком сортів з трикутною головою: Головка: утворення склепіння | помірне | 5 |
| 21 | Головка: забарвлення | жовте | 2 |
| 22 | Головка: горбкуватість | помірна | 5 |
| 23 | Головка: текстура | помірна | 5 |
| 24 | Головка: антоціанове забарвлення після збиральної стиглості | наявне | 9 |
| 25 | Квітка: забарвлення | жовте | 2 |
| 26 | Час досягання за весняного садіння | середній | 5 |
| 27 | Час досягання за літнього садіння | ознака не визначалась | 0 |
| 28 | Чоловіча стерильність | ознака не визначалась | 0 |

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність – 50 т/га, товарна врожайність – 43 т/га, період від повних сходів до початку досягання – 70 діб, період плодоношення – 15 діб, вміст білка – 1,5 %, вміст вітаміну С – 13 мг%, вміст загального цукру – 17 %, вміст сухої речовини – 30 %.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп, Полісся.