

Вид: Капуста цвітна *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *botrytis*

Заявка № 14101001 Назва сорту: Саборд

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

11.02.2016

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160099

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Сіянець: антоціанове забарвлення гілокотиля	наявне	9
2	Рослина: за висотою (за збирання)	середня	5
3	Зовнішнє стебло: за довжиною (до місця прикріплення першого листка)	середнє	5
4	Листок: положення	напівпрямий	3
5	Листок: за довжиною	короткий	3
6	Листок: за шириноро	середній	5
7	Листок: відношення ширина/довжина	середнє	5
8	Листок: часточковість	відсутня	1
9	Листок: забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	стро-зелене	2
10	Листок: інтенсивність забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	помірне	5
11	Листок: закручування верхівки	сильне	7
12	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	2
13	Листок: пухирчатість	помірна	5
14	Листок: зморшкуватість біля головної жилки	помірна	5
15	Листок: хвилястість краю	помірна	5
16	Головка: покриття внутрішніми листками	частково покрита	2
17	Головка: за висотою	середня	5
18	Головка: за діаметром	середня	5
19	Головка: форма поздовжнього розрізу	широко-еліптична	2
20	За винятком сортів з трикутною головкою: Головка: утворення склепіння	помірне	5
21	Головка: забарвлення	бліувате	1
22	Головка: горбкуватість	помірна	5
23	Головка: текстура	помірна	5
24	Головка: антоціанове забарвлення після збиральної стигlosti	наявне	9
25	Квітка: забарвлення	бліле	1
26	Час досягнання за весняного садіння	середній	5
27	Час досягнання за літнього садіння	середній осінній тип	5
28	Чоловіча стерильність	повна	3

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність – 25,7 т/га, товарна врожайність – 24,6 т/га, період від повних сходів до початку достигання – 77 діб, період плодоношення – 17 діб, вміст білка – 1,4 %, вміст вітаміну С – 13 мг%, вміст загального цукру – 17 %, вміст сухої речовини – 30 %.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп, Полісся.