

Вид: Капуста червоноголова *Brassica oleracea* L. var. *rubra* DC.

Заявка № 14097004 Назва сорту: Ред Харизма

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

15.02.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160305

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| №    | Ознака  | Проявлення               | Код |
|------|---|--------------------------|-----|
| 1,1  | Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою  | ознака не визначається   | 0   |
| 1,2  | Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою                                     | середня                  | 5   |
| 1,3  | Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою   | ознака не визначається   | 0   |
| 2,1  | Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками) | ознака не визначається   | 0   |
| 2,2  | Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)                | середній                 | 5   |
| 2,3  | Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)                    | ознака не визначається   | 0   |
| 3    | Рослина: довжина зовнішнього качана   | середній                 | 5   |
| 4    | Рослина: положення зовнішніх листків  | напівпрямостоячі         | 3   |
| 5,1  | Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: за розміром                              | ознака не визначається   | 0   |
| 5,2  | Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: за розміром                           | середній                 | 5   |
| 5,3  | Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: за розміром                               | ознака не визначається   | 0   |
| 6    | Зовнішній листок: форма пластинки   | округла                  | 3   |
| 7    | Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки  | опуклий                  | 3   |
| 8,1  | Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості   | відсутня або дуже слабка | 1   |
| 8,2  | Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості                     | ознака не визначається   | 0   |
| 9,1  | Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирів          | малі                     | 3   |
| 9,2  | Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирів                            | ознака не визначається   | 0   |
| 10   | Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість                              | ознака не визначається   | 0   |
| 11   | Зовнішній листок: колір (з восковим нальотом)   | фіолетовий               | 5   |
| 12   | Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення   | помірне                  | 5   |
| 13   | Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість                        | наявна                   | 9   |
| 14   | Зовнішній листок: восковий наліт  | помірний                 | 5   |
| 15   | Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю  | помірна                  | 5   |
| 16   | Зовнішній листок: вигин краю  | наявний                  | 9   |
| 17   | Головка: форма поздовжнього розтину   | широкоеліптична          | 4   |
| 18   | Головка: форма основи поздовжнього розтину  | округла                  | 1   |
| 19   | Головка: за довжиною  | середня                  | 5   |
| 20   | Головка: за діаметром   | середня                  | 5   |
| 21   | Головка: розміщення найбільшого діаметра  | посередині               | 2   |
| 22   | Головка: ступінь покриття   | покрита                  | 3   |
| 23   | Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка                    | ознака не визначається   | 0   |
| 24   | Головка: вигин краю покривного листка   | наявний                  | 9   |
| 25   | Головка: забарвлення покривного листка  | фіолетове                | 5   |
| 26   | Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка  | темне                    | 7   |
| 27   | Лише сорти капусти білоголової і савойської. Головка: антоціанове забарвлення покривних листків | ознака не визначається   | 0   |
| 28   | Головка: внутрішнє забарвлення  | фіолетове                | 4   |
| 29   | Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність зовнішнього забарвлення               | темне                    | 7   |
| 30   | Головка: за щільністю   | щільна                   | 7   |
| 31   | Головка: внутрішня структура  | середня                  | 5   |
| 32   | Головка: довжина внутрішнього качана відносно довжини головки                                   | середня                  | 5   |
| 33,1 | Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості  | ознака не визначається   | 0   |
| 33,2 | Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості                                     | пізній                   | 7   |
| 33,3 | Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості   | ознака не визначається   | 0   |
| 34   | Час розтріскування головки після досягання  | пізній                   | 7   |
| 35   | Чоловіча стерильність   | наявна                   | 9   |
| 36   | Стіякість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f sp. <i>Conglutinans</i>                         | відсутня                 | 1   |

## За інформацією наданою заявником:

## - показники господарської придатності

Загальна урожайність – 98 т/га, період від повних сходів до початку досягання – 140 діб, лежкість – 7 балів, вміст вітаміну С – 49 мг%, вміст загального цукру – 5,5 %, вміст сухої речовини – 8,3 %.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп, Полісся.