

Вид: Квасоля звичайна (овочева) *Phaseolus vulgaris* L.

Заявка № 13127003 **Назва сорту:** Крокет

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

11.02.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160100

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: антоціанове забарвлення гіпокотіля	відсутнє	1
2	Рослина: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотіля	ознака не визначається	0
3	Рослина: тип росту	кущовий	1
4	Виткі сорти. Рослина: архітектоніка	ознака не визначається	0
5	Кущові сорти. Рослина: тип росту	не сланкий	1
6	Кущові сорти. Рослина: за висотою	низька	3
7	Виткі сорти. Рослина: початок завивання (80% рослин)	ознака не визначається	0
8	Виткі сорти. Рослина: швидкість завивання	ознака не визначається	0
9	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
10	Листок: зморшкуватість	помірна	5
11	Верхівковий листочок: за розміром	середній	5
12	Верхівковий листочок: форма	від трикутної до округлої	2
13	Верхівковий листочок: довжина верхівки	довга	3
14	Кущові сорти. Суцвіття: положення (за повного цвітіння)	переважно в листках	1
15	Квітка: розмір приквітка	середній	5
16	Квітка: колір паруса	рожеувато-білий	2
17	Квітка: колір крил	рожеувато-білий	2
18	Кущові сорти. Біб: за довжиною (за виключенням гачка)	середній	5
19	Виткі сорти. Біб: за довжиною (як для 18)	ознака не визначається	0
20	Біб: за шириною	вузький	3
21	Біб: за товщиною	тонкий	3
22	Біб: форма поперечного перерізу (через насінину)	округла	4
23	Біб: відношення товщини до ширини	середнє	5
24	Біб: основний колір	зелений	2
25	Біб: інтенсивність основного кольору	помірний	5
26	Біб: вторинний колір	відсутній	1
27	Біб: колір вторинного забарвлення	ознака не визначається	0
28	Біб: щільність плям вторинного кольору	ознака не визначається	0
29	Біб: волокнистість вентрального (черевного) шва	наявна	9
30	Біб: ступінь вигину	слабкий	3
31	Біб: форма вигину	увігнута	1
32	Біб: форма верхівки (за виключенням гачка)	загострена	1
33	Біб: довжина гачка	середній	5
34	Біб: вигин гачка	слабкий	3
35	Біб: характер поверхні	зморшкувата	3
36	Біб: звуження (в сухому стані)	відсутнє або дуже слабке	1
37	Насіння: маса 1000 насінин	низька	3
38	Насіння: форма поздовжнього розтину	від округлої до еліптичної	2
39	Сорти з ниркоподібним насінням. Насіння: ступінь вигину	ознака не визначається	0
40	Насіння: форма поперечного перерізу	еліптична	3
41	Насіння: поперечний переріз за шириною	середній	5
42	Насіння: за довжиною	коротка	3
43	Насіння: кількість кольорів	один	1
44	Насіння: основний колір (найбільша зона)	білий	1
45	Насіння: вторинний колір	ознака не визначається	0
46	Насіння: розподіл переважаючого вторинного кольору	ознака не визначається	0
47	Насіння: жилкування	слабке	3
48	Час цвітіння (50% рослин мають щонайменше одну квітку)	середній	5
49,1	Стійкість до антракнозу квасолі (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>): Паса б	ознака не визначалась	0
49,2	Стійкість до антракнозу квасолі (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>): Паса Кappa	ознака не визначалась	0
50	Стійкість до вірусної мозаїки квасолі Bean Common Mosaic Necrosis Virus (BCMNV)	ознака не визначалась	0
51	Стійкість до кутастої бактеріальної плямистості (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>phaseolicola</i>): Паса б	ознака не визначалась	0
52	Стійкість до звичайної плямистості квасолі (<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i>), ізолят 422	ознака не визначалась	0

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Урожайність зерна (за стардатної вологості 14%) – 0,65 т/га, тривалість вегетації рослин – 40 днів, висота рослин – 80 см, маса 100 бобів – 180 г, стійкість до обсіпання – 8 балів, стійкість до вилягання – 8 балів, висота прикріплення нижнього бобу – 22 см, посухостійкість – 8 балів, вміст сирого протеїну – 23 %.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп, Полісся.