

Вид: Морква *Daucus carota* L.

Заявка № 14109006 Назва сорту: Меркуріо

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

11.02.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160218

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Листки: ширина розетки	вузька	3
2	Листок: за положенням у просторі	напівпрямий	3
3	Листок: за довжиною (разом із черешком)	середній	5
4	Листок: розсіченість	помірна	5
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
6	Листок: антоціанове забарвлення черешка	відсутнє	1
7	Коренеплід: за довжиною	довгий	7
8	Коренеплід: за шириною	середній	5
9	Коренеплід: відношення довжина/ширина	середнє	5
10	Коренеплід: форма у поздовжньому розрізі	вузьковидовжена	6
11	Сорти оцінені в проміжку 4 і 6 для ознаки 10: Коренеплід: тенденція до кінчної форми	слабка	3
12	Коренеплід: форма плеча	округла	3
13	Коренеплід: форма кінчика (повністю сформований)	тупа	1
14	Коренеплід: колір поверхні	оранжевий	3
15	За винятком сортів з білим зовнішнім забарвленням коренеплоду. Коренеплід: інтенсивність забарвлення поверхні	помірна	5
16	Коренеплід: антоціанове забарвлення поверхні плеча	наявне	9
17	Коренеплід: розмір зеленого забарвлення поверхні плеча	малий	3
18	Коренеплід: наявність борозенок на поверхні	слабко виражені	3
19	Коренеплід: діаметр серцевини відносно загального діаметра	великий	7
20	Коренеплід: забарвлення серцевини	оранжеве	3
21	За винятком сортів з білою серцевиною. Коренеплід: інтенсивність забарвлення серцевини	помірне	5
22	Коренеплід: забарвлення шкірки	оранжеве	3
23	За винятком сортів з білою шкіркою. Коренеплід: інтенсивність забарвлення шкірки	помірне	5
24	Коренеплід: забарвлення серцевини порівняно із забарвленням шкірки	однакова	2
25	Коренеплід: зелене забарвлення внутрішньої частини верхівки (у поздовжньому розрізі)	помірне	5
26	Коренеплід: надземна частина	відсутня або дуже мала	1
27	Тільки сорти з тупими верхівками. Коренеплід: час розвитку заокругленої верхівки	середній	5
28	Коренеплід: час забарвлення верхівки	середній	5
29	Рослина: тенденція до стрілкування	слабка	3
30	Рослина: висота першого зонтика під час його цвітіння	середній	5
31	Рослина: частка рослин з чоловічою стерильністю	багато	3
32	Рослина: тип чоловічої стерильності	коричневі пиляки	1

## За інформацією наданою заявником:

## - показники господарської придатності

Товарна врожайність – 55 т/га, тривалість періоду до досягання – 80 днів, вміст сухої речовини – 7,8 %, вміст загального цукру – 8,6 %.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп, закритий ґрунт.