

**Вид:** Огірок посівний *Cucumis sativus* L.

**Заявка №** 13110013 **Назва сорту:** Велокс

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 25.03.2016 **Патент №** 160129

**Дата пріоритету:** 05.12.2013

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 15.02.2016

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 160444

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Сім'ядолі: гіркота	відсутня	1
2	Рослина: тип росту	детермінантний	1
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	середні	5
4	Листкова пластинка: положення у просторі	обвисле	3
5	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
6	Листкова пластинка: відношення довжина верхньої лопаті / довжина пластинки	помірне	5
7	Листкова пластинка: форма верхівки верхньої лопаті	прямокутна	2
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
9	Листкова пластинка: пухирчатість	слабка	3
10	Листок: хвилястість країв	відсутня або слабка	1
11	Листкова пластинка: зубчастість країв	слабка	3
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	ранній	3
13	Рослина: виявлення статі	гіномоноеційність	3
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 1	1
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1
16	Партенокарпія	наявна	9
17	Плід: за довжиною	середній	5
18	Плід: діаметр	середній	5
19	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5
20	Плід: відношення діаметра насінної камери до діаметра плоду	середнє	5
21	Плід: форма поперечного перерізу	кугаста	3
22	Плід: форма основи плоду	тупа	3
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: довжина шийки	ознака не визначається	0
24	Плід: форма верхівки	округла	3
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	зелене	3
26	За винятком білих сортів: Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	помірне	5
27	Плід: ребристість	помірна	2
28	Плід: шви	наявні	9
29	Плід: зморшкватість	наявна	9
30	Плід: ступінь зморшкватості	слабкий	3
31	Плід: тип покриву	лише шипики	3
32	Плід: щільність покриву	помірний	5
33	Лише сорти з білою зав'яззю (озн. 15): Плід: забарвлення зав'язі	біле	1
34	Плід: горбочки	наявні	9
35	Плід: розмір горбочків	середні	5
36	Плід: довжина смужок	середні	5
37	Плід: плямистість	наявна	9
38	Плід: характер поширення плям	лише смугами	1
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	1/2 довжини	2
40	Плід: щільність плям	нещільно	3
41	Плід: наліт	помірний	5
42	Плід: довжина плодоніжки	середня	5
43	Плід: основний колір шкірки у фазі фізіологічної стиглості	жовтий	2
44	Стійкість до 1) Cladosporium cucumerinum	ознака не визначалась	0
45	Стійкість до звичайної мозаїки огірка (Cucumis Mosaic Virus (CMV))	ознака не визначалась	0
46	Стійкість до борошнистої роси (Podosphaera xanthii)	ознака не визначалась	0
47	Стійкість до несправжньої борошнистої роси (Pseudoperonospora cubensis)	ознака не визначалась	0
48	Стійкість до бурої плямистості (Corynespora melonis)	ознака не визначалась	0
49	Стійкість до вірусу пожовтіння судин огірка (CVYV)	ознака не визначалась	0
50	Стійкість до вірусу жовтої мозаїки кабачка (ZYMV)	ознака не визначалась	0

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Загальна урожайність – 45 т/га, вміст сухої речовини у плоді – 2%, тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості – 45 діб.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** Степ.