

Вид: Огірок посівний *Cucumis sativus L.***Заявка №** 14110020 **Назва сорту:** Доктор**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:****Патент №****Дата пріоритету:**

30.12.2015

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 151091**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Сім'ядолі: гіркота	відсутня	1
2	Рослина: тип росту	індегермінантний	2
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжузлів	середні	5
4	Листкова пластина: положення у просторі	горизонтальне	2
5	Листкова пластина: за довжиною	середня	5
6	Листкова пластина: відношення довжина верхньої лопаті / довжина пластинки	мале	3
7	Листкова пластина: форма верхівки верхньої лопаті	гостра	1
8	Листкова пластина: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
9	Листкова пластина: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
10	Листок: хвилястість країв	відсутня або слабка	1
11	Листкова пластина: зубчастість країв	дуже слабка	1
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	середній	5
13	Рослина: виявлення статі	гіномоноеційність	3
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 1 або 2	2
15	Завязь: забарвлення зовнішнього покриву	бліле	1
16	Партенокарпія	наявна	9
17	Плід: за довжиною	середній	5
18	Плід: діаметр	малий	3
19	Плід: відношення довжина/діаметр	мале	3
20	Плід: відношення діаметра настінної камери до діаметра плоду	дуже мале	1
21	Плід: форма поперечного перерізу	округла	1
22	Плід: форма основи плоду	тупа	3
23	Лиші для сортів із шийкою. Плід: довжина шийки	ознака не визначається	0
24	Плід: форма верхівки	округла	3
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стигlosti	зелене	3
26	За винятком більш сортів: Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	помірне	5
27	Плід: ребристість	відсутня або слабка	1
28	Плід: шви	відсутні	1
29	Плід: зморшкуватість	відсутня	1
30	Плід: ступінь зморшкуватості	ознака не визначається	0
31	Плід: тип покриву	лиши шипики	3
32	Плід: щільність покриву	щільний	7
33	Лиші сорти з білою завяззю (озн. 15): Плід: забарвлення зав'язі	бліле	1
34	Плід: горбочки	наявні	9
35	Плід: розмір горбочків	середні	5
36	Плід: довжина смужок	відсутні або дуже короткі	1
37	Плід: плямистість	відсутня	1
38	Плід: характер поширення плям	ознака не визначається	0
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	ознака не визначається	0
40	Плід: щільність плям	ознака не визначається	0
41	Плід: наліт	помірний	5
42	Плід: довжина плодоніжки	коротка	3
43	Плід: основний колір шкірки у фазі фізіологічної стигlosti	жовтий	2
44	Стійкість до 1) <i>Cladosporium cucumerinum</i>	наявна	9
45	Стійкість до звичайної мозаїки огірка (<i>Cucumis Mosaic Virus (CMV)</i>)	високо стійкий	3
46	Стійкість до борошнистої роси (<i>Podosphaera xanthii</i>)	високо стійкий	3
47	Стійкість до несправжньої борошнистої роси (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	високо стійкий	3
48	Стійкість до бурої плямистості (<i>Corynespora melonis</i>)	відсутня	1
49	Стійкість до вірусу пожовтіння судин огірка (CVYV)	відсутня	1
50	Стійкість до вірусу жовтої мозаїки кабачка (ZYMV)	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Загальна урожайність – 53 т/га, вміст сухої речовини у плоді – 2 %, тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стигlosti – 43 доби, період плодоношення – 85 діб.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: закритий ґрунт.