

Вид: Огірок посівний *Cucumis sativus* L.

Заявка № 14110021 Назва сорту: Контадор

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

30.12.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 151092

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Сім'ядолі: гіркота	відсутня	1
2	Рослина: тип росту	індетермінантний	2
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	середні	5
4	Листкова пластинка: положення у просторі	обвисле	3
5	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
6	Листкова пластинка: відношення довжина верхньої лопаті / довжина пластинки	мале	3
7	Листкова пластинка: форма верхівки верхньої лопаті	тупа	3
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
9	Листкова пластинка: пухирчатість	слабка	3
10	Листок: хвилястість країв	відсутня або слабка	1
11	Листкова пластинка: зубчастість країв	дуже слабка	1
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	ранній	3
13	Рослина: виявлення статі	гіномоноєційність	3
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 1 або 2	2
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1
16	Партенокарпія	наявна	9
17	Плід: за довжиною	короткий	3
18	Плід: діаметр	малий	3
19	Плід: відношення довжина/діаметр	мале	3
20	Плід: відношення діаметра насінної камери до діаметра плоду	дуже мале	1
21	Плід: форма поперечного перерізу	від округлої до кутастої	2
22	Плід: форма основи плоду	тупа	3
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: довжина шийки	ознака не визначається	0
24	Плід: форма верхівки	округла	3
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	зелене	3
26	За винятком білих сортів: Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	помірне	5
27	Плід: ребристість	відсутня або слабка	1
28	Плід: шви	відсутні	1
29	Плід: зморшкуватість	відсутня	1
30	Плід: ступінь зморшкуватості	ознака не визначається	0
31	Плід: тип покриву	лише шипики	3
32	Плід: щільність покриву	нещільний	3
33	Лише сорти з білою зав'яззю (озн. 15): Плід: забарвлення зав'язі	біле	1
34	Плід: горбочки	наявні	9
35	Плід: розмір горбочків	малі	3
36	Плід: довжина смужок	відсутні або дуже короткі	1
37	Плід: плямистість	відсутня	1
38	Плід: характер поширення плям	ознака не визначається	0
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	ознака не визначається	0
40	Плід: щільність плям	ознака не визначається	0
41	Плід: наліт	помірний	5
42	Плід: довжина плодоніжки	довга	7
43	Плід: основний колір шкірки у фазі фізіологічної стиглості	жовтий	2
44	Стійкість до 1) <i>Cladosporium cucumerinum</i>	наявна	9
45	Стійкість до звичайної мозаїки огірка ( <i>Cucumis Mosaic Virus (CMV)</i> )	високо стійкий	3
46	Стійкість до борошністої роси ( <i>Podosphaera xanthii</i> )	високо стійкий	3
47	Стійкість до несправжньої борошністої роси ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	високо стійкий	3
48	Стійкість до бурої плямистості ( <i>Corynespora melonis</i> )	відсутня	1
49	Стійкість до вірусу пожовтіння судин огірка (CVYV)	відсутня	1
50	Стійкість до вірусу жовтої мозаїки кабачка (ZYMV)	ознака не визначалась	0

## За інформацією наданою заявником:

## - показники господарської придатності

Загальна урожайність – 50 т/га, тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості – 47 діб, період плодоношення – 80 діб.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: закритий ґрунт.