

Вид: Огірок посівний *Cucumis sativus* L.

Заявка № 11035007 Назва сорту: Мареса

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету: 30.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

15.02.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160440

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Сім'ядолі: гіркота	відсутня	1
2	Рослина: тип росту	детермінантний	1
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	довгі	7
4	Листкова пластинка: положення у просторі	висхідне	1
5	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
6	Листкова пластинка: відношення довжина верхньої лопаті / довжина пластинки	помірне	5
7	Листкова пластинка: форма верхівки верхньої лопаті	прямокутна	2
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
9	Листкова пластинка: пухирчатість	слабка	3
10	Листок: хвилястість країв	відсутня або слабка	1
11	Листкова пластинка: зубчастість країв	слабка	3
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	середній	5
13	Рослина: виявлення статі	гіномоноєційність	3
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 1	1
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1
16	Партенокарпія	наявна	9
17	Плід: за довжиною	середній	5
18	Плід: діаметр	середній	5
19	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5
20	Плід: відношення діаметра насінної камери до діаметра плоду	середнє	5
21	Плід: форма поперечного перерізу	від округлої до кутастої	2
22	Плід: форма основи плоду	тупа	3
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: довжина шийки	ознака не визначається	0
24	Плід: форма верхівки	тупа	2
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	зелене	3
26	За винятком білих сортів: Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	помірне	5
27	Плід: ребристість	відсутня або слабка	1
28	Плід: шви	наявні	9
29	Плід: зморшкуватість	наявна	9
30	Плід: ступінь зморшкуватості	слабкий	3
31	Плід: тип покриву	лише шипики	3
32	Плід: щільність покриву	щільний	7
33	Лише сорти з білою зав'яззю (озн. 15): Плід: забарвлення зав'язі	біле	1
34	Плід: горбочки	наявні	9
35	Плід: розмір горбочків	малі	3
36	Плід: довжина смужок	відсутні або дуже короткі	1
37	Плід: плямистість	відсутня	1
38	Плід: характер поширення плям	ознака не визначається	0
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	ознака не визначається	0
40	Плід: щільність плям	ознака не визначається	0
41	Плід: наліт	відсутній або дуже слабкий	1
42	Плід: довжина плодоніжки	довга	7
43	Плід: основний колір шкірки у фазі фізіологічної стиглості	жовтий	2
44	Стойкість до 1) <i>Cladosporium cucumerinum</i>	ознака не визначалась	0
45	Стойкість до звичайної мозаїки огірка (<i>Cucumis Mosaic Virus (CMV)</i>)	ознака не визначалась	0
46	Стойкість до борошністої роси (<i>Podosphaera xanthii</i>)	ознака не визначалась	0
47	Стойкість до несправжньої борошністої роси (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	ознака не визначалась	0
48	Стойкість до бурої плямистості (<i>Corynespora melonis</i>)	ознака не визначалась	0
49	Стойкість до вірусу пожовтіння судин огірка (<i>CVYV</i>)	ознака не визначалась	0
50	Стойкість до вірусу жовтої мозаїки кабачка (<i>ZYMV</i>)	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність – 83 т/га, вміст сухої речовини у плоді – 6,1 %, тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості – 40 діб. Період плодоношення – 44 доби.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ.