

Вид: Огірок посівний *Cucumis sativus L.***Заявка №** 11035008 **Назва сорту:** Монісія**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:****Дата пріоритету:** 30.11.2011**Патент №****Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 15.02.2016**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 160441**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Сім'ядолі: гіркота	відсутня	1
2	Рослина: тип росту	детермінантний	1
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжузлів	середні	5
4	Листкова пластина: положення у просторі	горизонтальне	2
5	Листкова пластина: за довжиною	середня	5
6	Листкова пластина: відношення довжина верхньої лопаті / довжина пластинки	велике	7
7	Листкова пластина: форма верхівки верхньої лопаті	прямокутна	2
8	Листкова пластина: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
9	Листкова пластина: пухирчастість	помірна	5
10	Листок: хвилястість країв	відсутня або слабка	1
11	Листкова пластина: зубчастість країв	слабка	3
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	ранній	3
13	Рослина: виявлення статі	гіномоноеційність	3
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 1	1
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	бліле	1
16	Партенокарпія	наявна	9
17	Плід: за довжиною	середній	5
18	Плід: діаметр	середній	5
19	Плід: відношення довжина/діаметр	має	3
20	Плід: відношення діаметра настинної камери до діаметра плоду	середнє	5
21	Плід: форма поперечного перерізу	округла	1
22	Плід: форма основи плоду	тупа	3
23	Лиші для сортів із шийкою. Плід: довжина шийки	ознака не визначається	0
24	Плід: форма верхівки	округла	3
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стигlosti	зелене	3
26	За винятком більш сортів: Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	темне	7
27	Плід: ребристість	відсутня або слабка	1
28	Плід: шви	відсутні	1
29	Плід: зморшкуватість	наявна	9
30	Плід: ступінь зморшкуватості	слабкий	3
31	Плід: тип покриву	лише шипики	3
32	Плід: щільність покриву	помірний	5
33	Лиші сортів з білою зав'яззю (озн. 15): Плід: забарвлення зав'язі	бліле	1
34	Плід: горбочки	наявні	9
35	Плід: розмір горбочоків	малі	3
36	Плід: довжина смужок	короткі	3
37	Плід: плямистість	наявна	9
38	Плід: характер поширення плям	лише смугами	1
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	1/3 довжини	1
40	Плід: щільність плям	нешільно	3
41	Плід: наліт	відсутній або дуже слабкий	1
42	Плід: довжина плодоніжки	середня	5
43	Плід: основний колір шкірки у фазі фізіологічної стигlosti	жовтий	2
44	Стійкість до 1) <i>Cladosporium cucumerinum</i>	ознака не визначалась	0
45	Стійкість до звичайної мозаїки огірка (<i>Cucumis Mosaic Virus (CMV)</i>)	ознака не визначалась	0
46	Стійкість до борошнистої роси (<i>Podosphaera xanthii</i>)	ознака не визначалась	0
47	Стійкість до несправжньої борошнистої роси (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	ознака не визначалась	0
48	Стійкість до бурої плямистості (<i>Corynespora melonis</i>)	ознака не визначалась	0
49	Стійкість до вірусу пожовтіння судин огірка (CVYV)	ознака не визначалась	0
50	Стійкість до вірусу жовтої мозаїки кабачка (ZYMV)	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Загальна урожайність – 85 т/га, вміст сухої речовини у плоді – 6,1 %, тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стигlosti – 44 доби, період плодоношення – 38 діб.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ.