

Вид: Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L.**Заявка №** 14113024**Назва сорту:** Редкан**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:****Патент №****Дата пріоритету:****Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:**

30.12.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 151103**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9
2	Рослина: габітус	напівпрямий	2
3	Рослина: довжина головного стебла	середнє	5
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	відсутні	1
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями (тест на рослинах без чеканки)	ознака не визначається	0
6	Тільки для сортів без укорочених пагонів. Рослина: довжина міжвузлів (на пагонах I-го порядку)	середні	5
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	помірне	5
9	Стебло: опущення вузлів	помірне	5
10	Рослина: за висотою	середня	5
11	Листок: довжина пластинки	середня	5
12	Листок: ширина пластинки	середня	5
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
14	Листок: за формою	широко-еліптичний	3
15	Листок: хвильистість краю	слабка	3
16	Листок: пухирчастість	слабка	3
17	Листок: форма в поперечному перерізі	помірноувігнута	3
18	Листок: глянсуватість	помірна	5
19	Квітконіжка: положення	поникле	3
20	Квітка: антоціанове забарвлення пиліаків	наявне	9
21	Плід: забарвлення (перед досягненням)	зелене	3
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед досягненням)	темне	7
23	Плід: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
24	Плід: положення у просторі	поникле	3
25	Плід: за довжиною	середній	5
26	Плід: діаметр	середній	5
27	Плід: відношення довжина/діаметр	велике	7
28	Плід: форма у поздовжньому розрізі	трикутна	7
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні плаенти)	еліптична	1
30	Плід: хвильистість перикарпу у базальній частині	відсутня або дуже слабка	1
31	Плід: хвильистість перикарпу (базальну частину не беруть до уваги)	відсутня або дуже слабка	1
32	Плід: структура поверхні	гладенька або злегка зморшкувана	1
33	Плід: забарвлення (за досягнення)	червоне	3
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за досягнення)	темне	7
35	Плід: глянсуватість	помірна	5
36	Плід: порожнина у плодоніжці	наявна	9
37	Плід: глибина порожнини у плодоніжці	мілка	3
38	Плід: форма верхівки	загострена	2
39	Плід: глибина борозенок між частками	відсутня або дуже мілкі	1
40	Плід: кількість часток	два-три	2
41	Плід: товщина м'якоті	товста	7
42	Плодоніжка: за довжиною	середня	5
43	Плодоніжка: за товщиною	середня	5
44	Чашечка: за характером виявлення	необгортакча	1
45	Плід: капсіцин у плаценті	відсутній	1
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	середній	5
47	Час досягнення	середній	5
48,1	Стійкість до <i>Tobamovirus</i> : Стійкість до <i>Tobamovirus</i> : Патотип 0 (<i>Tobacco Mosaic Virus (0)</i>)	наявна	9
48,2	Стійкість до <i>Tobamovirus</i> : Патотип 1-2 (<i>Tomato Mosaic Virus (1-2)</i>)	відсутня	1
48,3	Стійкість до <i>Tobamovirus</i> : Патотип 1-2-3 (<i>Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3)</i>)	відсутня	1
49,1	Стійкість до <i>Potato Virus</i> : Патотип 0	відсутня	1
49,2	Стійкість до <i>Potato Virus</i> : Патотип 1	відсутня	1
49,3	Стійкість до <i>Potato Virus</i> : Патотип 1 – 2	відсутня	1
50	Стійкість до <i>Phytophthora capsici</i>	відсутня	1
51	Стійкість до <i>Cucumber Mosaic Virus (CMV)</i>	відсутня	1
52	Стійкість до <i>Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)</i>	наявна	9
53	Стійкість до <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>Vesicatoria</i>	відсутня	1

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність – 77 т/га, середня маса плоду – 140 г, вміст сухої речовини – 5 %, тривалість періоду до досягнення – 74 доби, вміст загального цукру – 4,1 %, вміст вітаміну С – 12 мг%, вміст клітковини – 2,5 %.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: закритий ґрунт.