

Вид: Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L.

Заявка № 10037012 **Назва сорту:** Фея

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету: 15.12.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

27.11.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 151094

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: габітус	розлогий	3
3	Рослина: довжина головного стебла	середнє	5
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	наявні	9
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями (тест на рослинах без чеканки)	більше трьох	3
6	Тільки для сортів без укорочених пагонів. Рослина: довжина міжвузлів (на пагонах I-го порядку)	ознака не визначається	0
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	помірне	5
9	Стебло: опушення вузлів	помірне	5
10	Рослина: за висотою	середня	5
11	Листок: довжина пластинки	коротка	3
12	Листок: ширина пластинки	вузька	3
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
14	Листок: за формою	ланцетний	1
15	Листок: хвилястість краю	слабка	3
16	Листок: пухирчастість	помірна	5
17	Листок: форма в поперечному перерізі	помірно увігнута	3
18	Листок: глянуватість	помірна	5
19	Квітконіжка: положення	поникле	3
20	Квітка: антоціанове забарвлення пелючків	наявне	9
21	Плід: забарвлення (перед досяганням)	зеленувато-біле	1
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед досяганням)	помірне	5
23	Плід: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
24	Плід: положення у просторі	поникле	3
25	Плід: за довжиною	короткий	3
26	Плід: діаметр	середній	5
27	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5
28	Плід: форма у поздовжньому розрізі	трикутна	7
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні плаценти)	кругла	3
30	Плід: хвилястість перикарпу у базальній частині	помірна	5
31	Плід: хвилястість перикарпу (базальну частину не беруть до уваги)	відсутня або дуже слабка	1
32	Плід: структура поверхні	гладенька або злегка зморшкувата	1
33	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	3
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за досягання)	помірне	5
35	Плід: глянуватість	помірна	5
36	Плід: порожнина у плодоніжці	відсутня	1
37	Плід: глибина порожнини у плодоніжці	ознака не визначається	0
38	Плід: форма верхівки	загострена	2
39	Плід: глибина борозенок між частками	мілкі	3
40	Плід: кількість часток	три-чотири	4
41	Плід: товщина м'якоті	товста	7
42	Плодоніжка: за довжиною	коротка	3
43	Плодоніжка: за товщиною	середня	5
44	Чашечка: за характером виявлення	необгортаюча	1
45	Плід: капсицин у плаценті	відсутній	1
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	середній	5
47	Час досягання	середній	5
48,1	Стійкість до Tobamovirus: Стійкість до Tobamovirus: Патотип 0 (Tobacco MosaicVirus (0))	ознака не визначалась	0
48,2	Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2 (Tomato MosaicVirus (1-2))	ознака не визначалась	0
48,3	Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3))	ознака не визначалась	0
49,1	Стійкість до Potato Virus: Патотип 0	ознака не визначалась	0
49,2	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1	ознака не визначалась	0
49,3	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1 – 2	ознака не визначалась	0
50	Стійкість до Phytophthora capsici	ознака не визначалась	0
51	Стійкість до Cucumber Mosaic Virus (CMV)	ознака не визначалась	0
52	Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	ознака не визначалась	0
53	Стійкість до Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Середня маса плоду – 80 г, вміст сухої речовини – 8,9 %, тривалість періоду до досягання – 92 доби, товщина стінки плоду – 6 мм, вміст загального цукру – 4,6 %, вміст клітковини – 1,5 %.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп, Полісся, закритий ґрунт.