

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка № 14115011 Назва сорту: Зульфія

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

02.03.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160626

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	середня кількість	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	помірне	5
5	Тільки індетермінантні сорти. Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною	середній	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
12	Листок: глясуватість (як для б)	помірна	5
13	Листок: пухирчастість (як для б)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: інтенсивність галуження (другої і третьої китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	ознака не визначалась	0
18	Квітка: опушення приймочки	наявне	9
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки)	середня	5
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	маленьке	3
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	округла	3
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	мілке	3
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	маленький	3
29	Плід: розмір квіткового рубця	маленький	3
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному перерізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	товстий	7
33	Плід: кількість камер	чотири, п'ять або шість	4
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (як для 34)	ознака не визначається	0
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (як для 38)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	дуже твердий	9
41	Плід: строк лежкості	дуже тривалий	9
42	Час цвітіння	ранній	3
43	Час досягання	дуже ранній	1
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	високий	7
45	Наявність сріблястості	відсутня	1
46	Стойкість до <i>Meloidogyne incognita</i>	відсутня	1
47	Стойкість до <i>Verticillium dahliae</i> : Paca 0	наявна	9
48,1	Стойкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Paca 0	наявна	9
48,2	Стойкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Paca 1	наявна	9
49	Стойкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	наявна	9
50,1	Стойкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Paca 0	наявна	9
50,2	Стойкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи А	наявна	9
50,3	Стойкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи В	наявна	9
50,4	Стойкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи С	наявна	9
50,5	Стойкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи D	наявна	9
50,6	Стойкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи Е	наявна	9
51,1	Стойкість до <i>Tomato Mosaic Virus</i> : Патотипу 0	наявна	9
51,2	Стойкість до <i>Mosaic Virus</i> : Патотипу 1	наявна	9
51,3	Стойкість до <i>Mosaic Virus</i> : Патотипу 2	наявна	9
51,4	Стойкість до <i>Mosaic Virus</i> : Патотипу 1-2	наявна	9
52	Стойкість до <i>Phytophthora infestans</i>	ознака не визначалась	0
53	Стойкість до <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	ознака не визначалась	0
54	Стойкість до <i>Stemphylium</i> spp.	наявна	9
55	Стойкість до <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>Tomato</i>	ознака не визначалась	0
56	Стойкість до <i>Ralstonia solanacearum</i>	ознака не визначалась	0

№	Ознака	Проявлення	Код
57	Стійкість до Tomato Yellow Leaf Curl Virus	відсутня	1
58	Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus	наявна	9
59	Стійкість до Leveillula taurica	ознака не визначалась	0
60	Стійкість до Oidium lycopersicum	наявна	9

**За інформацією наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Вміст сухої речовини в плоді – 5,0 %, вміст вітаміну С – 12 мг%, маса товарного плоду – 200 г, період від повних сходів до початку дозрівання – 90 діб, загальна урожайність – 160 т/га.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** закритий ґрунт.