

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка № 13115011 Назва сорту: Рожевий велетень

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

27.11.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 151102

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотіля	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індегермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла виділяють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3
5	Тільки індегермінантні сорти. Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	похилий	7
7	Листок: за довжиною	середній	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	маленький	3
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	світле	3
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	помірна	5
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Суцвіття: інтенсивність галуження (другої і третьої китиці)	середня кількість	2
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	наявна	9
18	Квітка: опушення приимочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки)	коротка	3
22	Плід: за розміром	дуже великий	9
23	Плід: відношення довжини до діаметра	маленьке	3
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	плескато-округла	2
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	помірна	5
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	глибоке	7
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	великий	7
29	Плід: розмір квіткового рубця	великий	7
30	Плід: форма кінця плоду	від загибленої до плескатої	2
31	Плід: розмір плаценти у поперечному перерізі	дуже великий	9
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	більше шести	5
34	Плід: зелене плече (перед достиганням)	наявне	9
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	середній	5
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (як для 34)	помірне	5
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (як для 34)	світле	3
38	Плід: колір за достигання	рожевий	4
39	Плід: колір м'якоті (як для 38)	рожевий	4
40	Плід: за твердістю	мякий	3
41	Плід: строк лежкості	короткий	3
42	Час цвітіння	пізній	7
43	Час достигання	пізній	7
44	Плід: вміст сухої речовини (за достигання)	низький	3
45	Наявність сріблястості	наявна	9
46	Стійкість до <i>Meloidogyne incognita</i>	ознака не визначалась	0
47	Стійкість до <i>Verticillium dahliae</i> : Paca 0	ознака не визначалась	0
48,1	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Paca 0	ознака не визначалась	0
48,2	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Paca 1	ознака не визначалась	0
49	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	ознака не визначалась	0
50,1	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Paca 0	ознака не визначалась	0
50,2	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи А	ознака не визначалась	0
50,3	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи В	ознака не визначалась	0
50,4	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи С	ознака не визначалась	0
50,5	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи D	ознака не визначалась	0
50,6	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи Е	ознака не визначалась	0
51,1	Стійкість до Tomato Mosaic Virus: Патотипу 0	ознака не визначалась	0
51,2	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1	ознака не визначалась	0
51,3	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 2	ознака не визначалась	0
51,4	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1-2	ознака не визначалась	0
52	Стійкість до <i>Phytophthora infestans</i>	ознака не визначалась	0
53	Стійкість до <i>Ryzenochaepta lycopersici</i>	ознака не визначалась	0
54	Стійкість до <i>Stemphylium</i> spp.	ознака не визначалась	0
55	Стійкість до <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>Tomato</i>	ознака не визначалась	0
56	Стійкість до <i>Ralstonia solanacearum</i>	ознака не визначалась	0

№	Ознака	Проявлення	Код
57	Стійкість до Tomato Yellow Leaf Curl Virus	ознака не визначалась	0
58	Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus	ознака не визначалась	0
59	Стійкість до Leveillula taurica	ознака не визначалась	0
60	Стійкість до Oidium lycopersicum	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність – 80 т/га, маса товарного плоду – 250 г, період від повних сходів до початку дозрівання – 109 діб, період плодоношення – 62 доби, вміст сухої речовини в плоді – 3,38 %, вміст загального цукру – 3,7 %, вміст вітаміну С – 20,8 мг%, вміст каротину – 0,7 мг%, загальна кислотність – 0,5 %.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп, закритий ґрунт.