

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка № 15115005 Назва сорту: Ругантіно

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

26.02.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160629

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гілочки	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індегермінантний	2
3	Тільки індегермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Тільки індегермінантні сорти. Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 сучвіттям	середнє	5
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	похилий	7
7	Листок: за довжиною	середній	5
8	Листок: за шириною	широкий	7
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	помірна	5
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середні	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Сучвіття: інтенсивність галуження (другої і третьої китиці)	ознака не визначалась	0
17	Квітка: фасціація (перша квітка сучвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушнення приймочки	наявне	9
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки)	середня	5
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	ознака не визначалась	0
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	грушовидна	10
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	сильна	7
26	Плід: форма поперечного перерізу	не кругляста	1
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	глибоке	7
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	маленький	3
30	Плід: форма кінця плоду	від загибленої до плескатої	2
31	Плід: розмір плащення у поперечному перерізі	ознака не визначалась	0
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	більше шести	5
34	Плід: зелене плече (перед досягнанням)	наявне	9
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	середній	5
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (як для 34)	світле	3
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (як для 34)	світле	3
38	Плід: колір за досягнання	червоний	5
39	Плід: колір М'якоті (як для 38)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: строк лежкості	ознака не визначалась	0
42	Час цвітіння	пізній	7
43	Час досягнання	пізній	7
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягнання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	ознака не визначалась	0
46	Стійкість до <i>Meloidogyne incognita</i>	відсутня	1
47	Стійкість до <i>Verticillium dahliae</i> : Paca 0	наявна	9
48,1	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Paca 0	наявна	9
48,2	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Paca 1	відсутня	1
49	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	наявна	9
50,1	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Paca 0	ознака не визначалась	0
50,2	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи А	наявна	9
50,3	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи В	наявна	9
50,4	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи С	наявна	9
50,5	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи D	наявна	9
50,6	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи Е	наявна	9
51,1	Стійкість до Tomato Mosaic Virus: Патотипу 0	наявна	9
51,2	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1	ознака не визначалась	0
51,3	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 2	ознака не визначалась	0
51,4	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1-2	ознака не визначалась	0
52	Стійкість до <i>Phytophthora infestans</i>	ознака не визначалась	0
53	Стійкість до <i>Rhynchosphaera lycopersici</i>	ознака не визначалась	0
54	Стійкість до <i>Stemphylium</i> spp.	наявна	9
55	Стійкість до <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>Tomato</i>	ознака не визначалась	0
56	Стійкість до <i>Ralstonia solanacearum</i>	ознака не визначалась	0

№	Ознака	Проявлення	Код
57	Стійкість до Tomato Yellow Leaf Curl Virus	ознака не визначалась	0
58	Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus	відсутня	1
59	Стійкість до Leveillula taurica	ознака не визначалась	0
60	Стійкість до Oidium lycopersicum	ознака не визначалась	0

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Вміст сухої речовини в плоді – 5,0 %, вміст вітаміну С – 12 мг%, маса товарного плоду – 250 г, період від повних сходів до початку дозрівання – 103 доби, загальна врожайність – 150 т/га.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** закритий ґрунт.