

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка № 14115063 Назва сорту: Салерно

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

25.02.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160565

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	середня кількість	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	помірне	5
5	Тільки індетермінантні сорти. Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	піднесений	3
7	Листок: за довжиною	середній	5
8	Листок: за шириною	широкий	7
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	світле	3
12	Листок: глясуватість (як для б)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для б)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	середні	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	похиле	7
16	Суцвіття: інтенсивність галузнення (другої і третьої китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки)	середня	5
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	серцевидна	7
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: форма поперечного перерізу	не кругляста	1
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	помірне	5
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	середній	5
30	Плід: форма кінця плоду	від заглибленої до плескатої	2
31	Плід: розмір плаценти у поперечному перерізі	малий	3
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	дві-три	2
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	наявне	9
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	малий	3
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (як для 34)	світле	3
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (як для 34)	світле	3
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (як для 38)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: строк лежкості	тривалий	7
42	Час цвітіння	ранній	3
43	Час досягання	середній	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	відсутня	1
46	Стойкість до <i>Meloidogyne incognita</i>	наявна	9
47	Стойкість до <i>Verticillium dahliae</i> : Паса 0	наявна	9
48,1	Стойкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Паса 0	наявна	9
48,2	Стойкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Паса 1	наявна	9
49	Стойкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	відсутня	1
50,1	Стойкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Паса 0	відсутня	1
50,2	Стойкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи А	відсутня	1
50,3	Стойкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи В	відсутня	1
50,4	Стойкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи С	відсутня	1
50,5	Стойкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи D	відсутня	1
50,6	Стойкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи E	відсутня	1
51,1	Стойкість до <i>Tomato Mosaic Virus</i> : Патотипу 0	наявна	9
51,2	Стойкість до <i>Mosaic Virus</i> : Патотипу 1	наявна	9
51,3	Стойкість до <i>Mosaic Virus</i> : Патотипу 2	наявна	9
51,4	Стойкість до <i>Mosaic Virus</i> : Патотипу 1-2	наявна	9
52	Стойкість до <i>Phytophthora infestans</i>	відсутня	1
53	Стойкість до <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	відсутня	1
54	Стойкість до <i>Stemphylium</i> spp.	відсутня	1
55	Стойкість до <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>Tomato</i>	відсутня	1
56	Стойкість до <i>Ralstonia solanacearum</i>	відсутня	1
57	Стойкість до <i>Tomato Yellow Leaf Curl Virus</i>	відсутня	1

№	Ознака	Проявлення	Код
58	Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus	наявна	9
59	Стійкість до Leveillula taurica	відсутня	1
60	Стійкість до Oidium lycopersicum	відсутня	1

**За інформацією наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Загальна врожайність – 140 т/га, маса товарного плоду – 100 г, період від повних сходів до початку дозрівання – 85 діб, період плодоношення – 60 діб, вміст сухої речовини в плоді – 5,5 %, вміст загального цукру – 4,6 %, вміст вітаміну С – 21 мг%, вміст каротину – 1,5 мг%, загальна кислотність – 0,45 %.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** закритий ґрунт.