

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка № 14115062 Назва сорту: Сан Парадайз

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

25.02.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160564

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|------|--|--------------------------|-----|
| 1 | Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила | наявне | 9 |
| 2 | Рослина: тип розвитку | детермінантний | 1 |
| 3 | Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють) | середня кількість | 5 |
| 4 | Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині | слабке | 3 |
| 5 | Тільки індетермінантні сорти. Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям | ознака не визначається | 0 |
| 6 | Листок: за положенням (у середній третині рослини) | піднесений | 3 |
| 7 | Листок: за довжиною | середній | 5 |
| 8 | Листок: за шириною | середній | 5 |
| 9 | Листок: за розсіченістю | двічі перистий | 2 |
| 10 | Листок: розмір листочків (у середній частині листка) | середній | 5 |
| 11 | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення | помірне | 5 |
| 12 | Листок: глясуватість (як для б) | слабка | 3 |
| 13 | Листок: пухирчастість (як для б) | помірна | 5 |
| 14 | Листок: розмір пухирів (як для б) | малі | 3 |
| 15 | Листок: положення черешка листочків відносно головної осі | піднесене | 3 |
| 16 | Суцвіття: інтенсивність галуження (другої і третьої китиці) | в основному 1 гілка | 1 |
| 17 | Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття) | відсутня | 1 |
| 18 | Квітка: опушення приймочки | відсутнє або дуже слабке | 1 |
| 19 | Квітка: за кольором | жовта | 1 |
| 20 | Квітоніжка: відокремлюючий шар | відсутній | 1 |
| 21 | Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітоніжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки) | ознака не визначається | 0 |
| 22 | Плід: за розміром | середній | 5 |
| 23 | Плід: відношення довжини до діаметра | велике | 7 |
| 24 | Плід: форма у повздовжньому розрізі | циліндрична | 5 |
| 25 | Плід: ребристість біля плодоніжки | слабка | 3 |
| 26 | Плід: форма поперечного перерізу | не кругляста | 1 |
| 27 | Плід: поглиблення біля плодоніжки | мільке | 3 |
| 28 | Плід: розмір рубця плодоніжки | малий | 3 |
| 29 | Плід: розмір квіткового рубця | дуже малий | 1 |
| 30 | Плід: форма кінця плоду | від плескатої до гострої | 4 |
| 31 | Плід: розмір плаценти у поперечному перерізі | малий | 3 |
| 32 | Плід: за товщиною перикарпу | товстий | 7 |
| 33 | Плід: кількість камер | дві-три | 2 |
| 34 | Плід: зелене плече (перед досяганням) | відсутнє | 1 |
| 35 | Плід: розмір зеленого плеча (як для 34) | ознака не визначається | 0 |
| 36 | Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (як для 34) | ознака не визначається | 0 |
| 37 | Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (як для 34) | світле | 3 |
| 38 | Плід: колір за досягання | червоний | 5 |
| 39 | Плід: колір м'якоті (як для 38) | червоний | 5 |
| 40 | Плід: за твердістю | твердий | 7 |
| 41 | Плід: строк лежкості | помірний | 5 |
| 42 | Час цвітіння | середній | 5 |
| 43 | Час досягання | середній | 5 |
| 44 | Плід: вміст сухої речовини (за досягання) | помірний | 5 |
| 45 | Наявність сріблястості | відсутня | 1 |
| 47 | Стойкість до <i>Verticillium dahliae</i> : Паса 0 | наявна | 9 |
| 48,1 | Стойкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Паса 0 | наявна | 9 |
| 48,2 | Стойкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Паса 1 | відсутня | 1 |
| 49 | Стойкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i> | відсутня | 1 |
| 50,1 | Стойкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Паса 0 | відсутня | 1 |
| 50,2 | Стойкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи А | відсутня | 1 |
| 50,3 | Стойкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи В | відсутня | 1 |
| 50,4 | Стойкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи С | відсутня | 1 |
| 50,5 | Стойкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи D | відсутня | 1 |
| 50,6 | Стойкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи E | відсутня | 1 |
| 51,1 | Стойкість до <i>Tomato Mosaic Virus</i> : Патотипу 0 | відсутня | 1 |
| 51,2 | Стойкість до <i>Mosaic Virus</i> : Патотипу 1 | відсутня | 1 |
| 51,3 | Стойкість до <i>Mosaic Virus</i> : Патотипу 2 | відсутня | 1 |
| 51,4 | Стойкість до <i>Mosaic Virus</i> : Патотипу 1-2 | відсутня | 1 |
| 52 | Стойкість до <i>Phytophthora infestans</i> | відсутня | 1 |
| 53 | Стойкість до <i>Pyrenochaeta lycopersici</i> | відсутня | 1 |
| 54 | Стойкість до <i>Stemphylium</i> spp. | відсутня | 1 |
| 55 | Стойкість до <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>Tomato</i> | відсутня | 1 |
| 56 | Стойкість до <i>Ralstonia solanacearum</i> | відсутня | 1 |
| 57 | Стойкість до <i>Tomato Yellow Leaf Curl Virus</i> | відсутня | 1 |

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|--|------------|-----|
| 58 | Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus | відсутня | 1 |
| 59 | Стійкість до Leveillula taurica | відсутня | 1 |
| 60 | Стійкість до Oidium lycopersicum | відсутня | 1 |

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність – 85 т/га, маса товарного плоду – 80 г, період від повних сходів до початку дозрівання – 50 діб, період плодоношення – 25 діб, вміст сухої речовини в плоді – 5,4 %, вміст загального цукру – 208 %, вміст вітаміну С – 25 мг%, вміст каротину – 1,5 мг%, загальна кислотність – 0,47%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: закритий ґрунт.