

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка № 14115028 Назва сорту: Сейран

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

30.12.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 151104

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Тільки індетермінантні сорти. Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	похилий	7
7	Листок: за довжиною	довгий	7
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	маленький	3
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
12	Листок: глясуватість (як для б)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для б)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	похиле	7
16	Суцвіття: інтенсивність галуження (другої і третьої китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітоніжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітоніжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки)	коротка	3
22	Плід: за розміром	великий	7
23	Плід: відношення довжини до діаметра	маленьке	3
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	плескато-округла	2
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	мілке	3
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	маленький	3
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже маленький	1
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному перерізі	дуже маленький	1
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	три-чотири	3
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (як для 34)	ознака не визначається	0
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (як для 38)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: строк лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	ранній	3
43	Час досягання	ранній	3
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	низький	3
45	Наявність сріблястості	відсутня	1
46	Стійкість до <i>Meloidogyne incognita</i>	наявна	9
47	Стійкість до <i>Verticillium dahliae</i> : Паса 0	наявна	9
48,1	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Паса 0	наявна	9
48,2	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Паса 1	наявна	9
49	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	наявна	9
50,1	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Паса 0	наявна	9
50,2	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи А	наявна	9
50,3	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи В	відсутня	1
50,4	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи С	наявна	9
50,5	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи D	наявна	9
50,6	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи Е	наявна	9
51,1	Стійкість до <i>Tomato Mosaic Virus</i> : Патотипу 0	наявна	9
51,2	Стійкість до <i>Mosaic Virus</i> : Патотипу 1	наявна	9
51,3	Стійкість до <i>Mosaic Virus</i> : Патотипу 2	наявна	9
51,4	Стійкість до <i>Mosaic Virus</i> : Патотипу 1-2	наявна	9
52	Стійкість до <i>Phytophthora infestans</i>	наявна	9
53	Стійкість до <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	наявна	9
54	Стійкість до <i>Stemphylium</i> spp.	наявна	9
55	Стійкість до <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>Tomato</i>	відсутня	1
56	Стійкість до <i>Ralstonia solanacearum</i>	наявна	9

№	Ознака	Проявлення	Код
57	Стійкість до Tomato Yellow Leaf Curl Virus	наявна	9
58	Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus	відсутня	1
59	Стійкість до Leveillula taurica	наявна	9
60	Стійкість до Oidium lycopersicum	наявна	9

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Вміст сухої речовини в плоді – 5,7 %, вміст вітаміну С – 18,5 мг%, маса товарного плоду – 250 г, період від повних сходів до початку дозрівання – 90 діб, загальна врожайність – 30 т/га.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: закритий ґрунт.