

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка № 15115001 Назва сорту: Черрі Блосем

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

30.12.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 151112

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	середня кількість	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	помірне	5
5	Тільки індетермінантні сорти. Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною	середній	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	великий	7
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянуватість (як для б)	помірна	5
13	Листок: пухирчастість (як для б)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: інтенсивність галуження (другої і третьої китиці)	багато	3
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	наявне	9
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки)	середня	5
22	Плід: за розміром	маленький	3
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середне	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	округла	3
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	відсутнє або дуже мілке	1
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	маленький	3
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже маленький	1
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному перерізі	дуже маленький	1
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	тільки 2	1
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	наявне	9
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	середній	5
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (як для 34)	помірне	5
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (як для 34)	помірне	5
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (як для 38)	рожевий	4
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: строк лежкості	короткий	3
42	Час цвітіння	середній	5
43	Час досягання	середній	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	низький	3
45	Наявність сріблястості	ознака не визначалась	0
46	Стойкість до <i>Meloidogyne incognita</i>	наявна	9
47	Стойкість до <i>Verticillium dahliae</i> : Паса 0	наявна	9
48,1	Стойкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Паса 0	наявна	9
48,2	Стойкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Паса 1	наявна	9
49	Стойкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	ознака не визначалась	0
50,1	Стойкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Паса 0	ознака не визначалась	0
50,2	Стойкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи А	ознака не визначалась	0
50,3	Стойкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи В	ознака не визначалась	0
50,4	Стойкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи С	ознака не визначалась	0
50,5	Стойкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи D	ознака не визначалась	0
50,6	Стойкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи E	ознака не визначалась	0
51,1	Стойкість до <i>Tomato Mosaic Virus</i> : Патотипу 0	ознака не визначалась	0
51,2	Стойкість до <i>Mosaic Virus</i> : Патотипу 1	ознака не визначалась	0
51,3	Стойкість до <i>Mosaic Virus</i> : Патотипу 2	ознака не визначалась	0
51,4	Стойкість до <i>Mosaic Virus</i> : Патотипу 1-2	ознака не визначалась	0
52	Стойкість до <i>Phytophthora infestans</i>	ознака не визначалась	0
53	Стойкість до <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	ознака не визначалась	0
54	Стойкість до <i>Stemphylium</i> spp.	наявна	9
55	Стойкість до <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>Tomato</i>	наявна	9
56	Стойкість до <i>Ralstonia solanacearum</i>	ознака не визначалась	0
57	Стойкість до <i>Tomato Yellow Leaf Curl Virus</i>	ознака не визначалась	0

№	Ознака	Проявлення	Код
58	Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus	відсутня	1
59	Стійкість до Leveillula taurica	ознака не визначалась	0
60	Стійкість до Oidium lycopersicum	ознака не визначалась	0

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Загальна врожайність – 40 т/га, маса товарного плоду – 20 г, період від повних сходів до початку дозрівання – 65 діб, період плодоношення – 110 діб, вміст сухої речовини в плоді – 8,2 %, вміст загального цукру – 4,9 %, вміст вітаміну С – 21 мг%, вміст каротину – 1,2 мг%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: закритий ґрунт.