

**Вид:** Редька посівна (редиска) *Raphanus sativus* L. var. *sativus*

**Заявка №** 13118003 **Назва сорту:** Краса TOP

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:**

**Патент №**

**Дата пріоритету:**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:**

26.02.2016

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 160635

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Плоїдність	диплоїд	2
2	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
3	Сім'ядолі: за розміром	середні	5
4	Листкова розетка: за шириною зростання біля основи	вузька	3
5	Листок: положення у просторі	напіввисхідне	3
6	Листок: за довжиною	середній	5
7	Листкова пластинка: за формою	оберненояцевидна	3
8	Листкова пластинка: форма верхівки	округла	2
9	Листкова пластинка: відтінок зеленого кольору	відсутній	1
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого кольору	слабка	3
11	Листкова пластинка: кількість лопатей	мало	3
12	Листкова пластинка: надрізи країв	наявні	9
13	Листкова пластинка: глибина розрізів краю	помірні	5
14	Листкова пластинка: опушення	помірне	5
15	Черешок: антоціанове забарвлення	наявне	9
16	Черешок: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
17	Коренеплід: за товщиною	середній	5
18	Коренеплід: товщина головного кореня	тонкий	3
19	Коренеплід: за формою	округлий	2
20	Коренеплід: форма верхівки	плеската	2
21	Коренеплід: форма основи	округла	4
22	Коренеплід: забарвлення шкірки	однокольорове	1
23	Коренеплід: забарвлення верхньої частини	червоне	3
24	Коренеплід: характер виявлення червоного кольору у верхній частині	багрянний	2
25	Лише для двокольорових сортів. Коренеплід: розмір білої верхівки	ознака не визначається	0
26	Коренеплід: товщина кори	тонка	3
27	Коренеплід: забарвлення м'якоті	напівпрозоре біле	1
28	Час досягання	ранній	3
29	Коренеплід: здатність до утворення дулла	відсутня або дуже слабка	1

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність – 24 т/га, середня маса плоду – 6 г, тривалість періоду до досягання – 23 доби, вміст сухої речовини – 7 %, вміст вітаміну С – 25 мг%.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** Степ, Лісостеп, Полісся.