

Вид: Редька посівна (редиска) *Raphanus sativus* L. var. *sativus*

Заявка № 13118004 Назва сорту: Ополянка TOP

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

26.02.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160636

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Плоїдність	диплоїд	2
2	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
3	Сім'ядолі: за розміром	середні	5
4	Листкова розетка: за шириною зростання біля основи	вузька	3
5	Листок: положення у просторі	напіввисхідне	3
6	Листок: за довжиною	середній	5
7	Листкова пластинка: за формою	оберненояцевидна	3
8	Листкова пластинка: форма верхівки	округла	2
9	Листкова пластинка: відтінок зеленого кольору	відсутній	1
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
11	Листкова пластинка: кількість лопатей	середня кількість	5
12	Листкова пластинка: надрізи країв	наявні	9
13	Листкова пластинка: глибина розрізів краю	помірні	5
14	Листкова пластинка: опушення	слабке	3
15	Черешок: антоціанове забарвлення	наявне	9
16	Черешок: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
17	Коренеплід: за товщиною	тонкий	3
18	Коренеплід: товщина головного кореня	тонкий	3
19	Коренеплід: за формою	вузькопрямокутний	7
20	Коренеплід: форма верхівки	плеската	2
21	Коренеплід: форма основи	гостра	2
22	Коренеплід: забарвлення шкірки	двокольорове	2
23	Коренеплід: забарвлення верхньої частини	червоне	3
24	Коренеплід: характер виявлення червоного кольору у верхній частині	яскраво-червоний (кольору кіноварі)	1
25	Лише для двокольорових сортів. Коренеплід: розмір білої верхівки	дуже малий	1
26	Коренеплід: товщина кори	тонка	3
27	Коренеплід: забарвлення м'якоті	напівпрозоре біле	1
28	Час досягання	ранній	3
29	Коренеплід: здатність до утворення дулла	відсутня або дуже слабка	1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність – 22 т/га, середня маса плоду – 6 г, тривалість періоду до досягання – 21 доба, вміст сухої речовини – 6 %, вміст вітаміну С – 25 мг%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп, Полісся.