

Вид: Салат посівний головчастий *Lactuca sativa* var. *capitata* L.

Заявка № 13421002 Назва сорту: Кумак

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

26.02.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160638

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насінина: забарвлення	біле	1
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
3	Сіянець: розмір сім'ядолей (цілком розвинені)	середні	5
4	Сіянець: форма сім'ядолей	еліптична	5
5	Листок: за положенням	напівпрямостоячий	3
6	Листкова пластинка: за розсіченістю краю	часточкова	2
7	Рослина: діаметр	середній	5
8	Рослина: утворення головки	закрита головка	3
9	Тільки сорти із закритою головкою. Головка: ступінь перекриття верхньої частини листків	середня	5
10	Головка: за щільністю	середня	5
11	Головка: за розміром	середня	5
12	Лише для сортів маслянистоголовчастого типу. Головка: закриття основи	ознака не визначалася	0
13	Головка: форма у поздовжньому розрізі	широкоеліптична	3
14	Листок: за товщиною	середній	5
15	Листок: положення за збиральною стиглості (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листового і стеблового салатів)	горизонтальне	5
16	Листок: за формою	обернено-широкоеліптичний	5
17	Листок: форма верхівки	округла	3
18	Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків	жовтуватий	2
19	Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків	помірне	5
20	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
24	Листок: глянуватість з верхнього боку	сильна	7
25	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
26	Листок: пухирі за розміром	середні	5
27	Листкова пластинка: хвилястість краю	помірна	5
28	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки	наявні	9
29	Листкова пластинка: глибина розсіченості краю верхівки	помірні	5
30	Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки	помірна	5
31	Тільки сорти з сильною розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип розсіченості	ознака не визначається	0
32	Листкова пластинка: жилкування	невіялоподібне	1
33	Пазушне жилкування	відсутнє або дуже слабке	1
34	Час збиральної стиглості	середній	5
35	Час початку появи квітконоса	пізній	7
36	Рослина: за висотою (квітуча рослина)	середня	5
37	Рослина: фасціація (під час цвітіння)	відсутня	1
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час цвітіння)	ознака не визначається	0
39	Стойкість до борошнистої роси (<i>Bremia lactucae</i>)	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність – 25 т/га, середня маса плоду – 250 г; тривалість періоду до досягання – 80 діб.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп, Полісся, закритий ґрунт.