

**Вид:** Салат посівний листовий *Lactuca sativa* L. var. *secalina*

**Заявка №** 15120002 **Назва сорту:** Вілбур

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:**

**Патент №**

**Дата пріоритету:**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:**

15.02.2016

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 160457

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насінина: забарвлення	біле	1
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	наявне	9
3	Сіянець: розмір сім'ядолей (цілком розвинені)	ознака не визначалась	0
4	Сіянець: форма сім'ядолей	ознака не визначалась	0
5	Листок: за положенням	напівпрямостоячий	3
6	Листкова пластинка: за розсіченістю краю	ознака не визначалась	0
7	Рослина: за діаметром	середня	5
8	Рослина: утворення головки	не утворює	1
9	Тільки сорти із закритою головкою. Головка: ступінь перекриття верхньої частини листків	ознака не визначається	0
10	Головка: за щільністю	ознака не визначається	0
11	Головка: за розміром	ознака не визначається	0
12	Лише для сортів маслянистоголовчастого типу. Головка: закриття основи	ознака не визначається	0
13	Головка: форма у поздовжньому перерізі	ознака не визначається	0
14	Листок: за товщиною	тонкий	3
15	Листок: положення за збиральною стиглості (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листового і стеблового салатів)	напівпрямостояче	3
16	Листок: за формою	обернено-широкоеліптичний	5
17	Листок: форма верхівки	округла	3
18	Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків	червонуватий	4
19	Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків	темна	7
20	Листок: антоціанове забарвлення	наявне	9
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	дуже сильна	9
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	суцільне	2
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	тільки плямами	2
24	Листок: глянуватість з верхнього боку	помірна	5
25	Листок: пухирчастість	помірна	5
26	Листок: пухирі за розміром	малі	3
27	Листкова пластинка: хвилястість краю	сильна	7
28	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки	наявні	9
29	Листкова пластинка: глибина розсіченості краю верхівки	мілкі	3
30	Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки	часто	7
31	Тільки сорти з сильною розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип розсіченості	ознака не визначається	0
32	Листкова пластинка: жилкування	віялоподібне	2
33	Пазушне жилкування	помірне	5
34	Час збиральної стиглості	середній	5
35	Час початку появи квітконоса	дуже пізній	9
36	Рослина: за висотою (квітуча рослина)	ознака не визначалась	0
37	Рослина: фасціація (під час цвітіння)	наявна	9
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час цвітіння)	слабка	3
39	Стойкість до борошнистої роси ( <i>Bremia lactucae</i> ) Izolate B1:16	наявна	9

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність – 22 т/га, тривалість періоду до досягання – 50 діб.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** закритий ґрунт.