

Вид: Цибуля городня *Allium cepa* L.

Заявка № 12041018 Назва сорту: КАМПЕРО

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 25.03.2016 Патент № 160164

Дата пріоритету: 18.12.2012

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.02.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160496

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	багато	7
2	Листя: положення	напівпряме	3
3	Листя: восковий наліт	слабкий	3
4	Листя: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листя: зігнутість	відсутня або слабка	1
6,1	Тільки цибулеві сорти. Листок: за довжиною	середній	5
6,2	Тільки сорти шалот. Листок: за довжиною	ознака не визначається	0
7,1	Тільки цибулеві сорти. Листок: діаметр	середній	5
7,2	Тільки сорти шалот. Листок: діаметр	ознака не визначається	0
8	Тільки цибулеві сорти. Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	середнє	5
9	Тільки цибулеві сорти. Несправжнє стебло: діаметр (посередині довжини)	середній	5
10	Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення на цибулинка (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутня або дуже слабка	1
11	Цибулина: ступінь розщеплення на цибулинка (із сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутнє або дуже слабке	1
12,1	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: за розміром	велика	7
12,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: за розміром	ознака не визначається	0
13,1	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: за висотою	висока	7
13,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: за висотою	ознака не визначається	0
14,1	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: діаметр	великий	7
14,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: діаметр	ознака не визначається	0
15,1	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: відношення висоти до діаметра	середнє	5
15,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: відношення висота / діаметр	ознака не визначається	0
16	Цибулина/цибулинка: позиція максимального діаметра	посередині	2
17	Цибулина/цибулинка: ширина шийки	середня	5
18	Цибулина/цибулинка: форма (у поздовжньому розрізі)	округла	4
19	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: форма верхівки стебла (як для 18)	злегка опукла	3
20	Цибулина/цибулинка: форма основи (як для 18)	округла	3
21	Цибулина/цибулинка: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5
22	Цибулина/цибулинка: товщина сухої шкірки	середня	5
23	Цибулина/цибулинка: основний колір сухої шкірки	коричневий	5
24	За винятком сортів з білою сухою шкіркою. Цибулина/цибулинка: інтенсивність основного забарвлення сухої шкірки	сильне	7
25	Цибулина/цибулинка: відтінок забарвлення сухої шкірки	відсутній	1
26	Цибулина/цибулинка: забарвлення соковитих лусок	відсутнє	1
27	Цибулина/цибулинка: кількість точок зростання на кг	мало	3
28	Цибулина/цибулинка: вміст сухої речовини	низький	3
29	Тільки цибулеві сорти. Тенденція до стрілкування за весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
30	Тільки цибулеві сорти. Час стрілкування за весняної сівби	ознака не визначається	0
31	Тільки цибулеві сорти. Тенденція до стрілкування за сівби восени	ознака не визначалася	0
32	Тільки цибулеві сорти. Час стрілкування за сівби восени	ознака не визначається	0
33	Тільки цибулеві сорти. Час збиральної стиглості за сівби восени (листя обпало на 80% рослин)	ознака не визначається	0
34,1	Тільки цибулеві сорти. Час збиральної стиглості за весняної сівби (як для 33)	пізній	7
34,2	Тільки сорти шалот. Час збиральної стиглості (як для 33)	ознака не визначається	0
35	Час проростання за зберігання цибулин	ознака не визначалась	0
36	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Загальна врожайність – 70 т/га, тривалість вегетації рослин – 110 діб, вміст вітаміну С – 15 мг%, вміст сухої речовини – 10,0 %, вміст загального цукру – 9,0 %, лежкість – 240 діб.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ.