

Вид: Горіх грецький *Juglans regia* L.

Заявка № 13284002 Назва сорту: Легінь

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

16.03.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160681

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|---|---|-----|
| 1 | Дерево: за силою росту | середнє сили | 5 |
| 2 | Дерево: габітус | розлогий | 3 |
| 3 | Дерево: щільність розміщення гілок | середня щільність | 5 |
| 4 | Дерево: переважаюче розташування генеративних бруньок | на верхівці річного пагона (плодоношення по периферії дерева) | 1 |
| 5 | Річний пагін: забарвлення | зелено-коричневе | 3 |
| 6 | Листок: форма бічних листочків | еліптична | 5 |
| 7 | Квітка: кількість чоловічих суцвіть | середня кількість | 5 |
| 8 | Плід (горіх): за розміром | великий | 7 |
| 9 | Горіх: форма у поздовжньому розрізі (через шов) | широко-трапецієвидна | 5 |
| 10 | Горіх: форма у поздовжньому перерізі перпендикулярно до шва | широко-трапецієвидна | 5 |
| 11 | Горіх: форма у поперечному перерізі | стиснута | 1 |
| 12 | Горіх: коефіцієнт округlostі | середній | 5 |
| 13 | Горіх: форма основи (у перерізі перпендикулярно до шва) | зрізана | 3 |
| 14 | Горіх: форма верхівки (як для 13) | вимчаста | 4 |
| 15 | Горіх: помітність апікального кінчика | слабка | 3 |
| 16 | Горіх: положення «сідельця» на шві | за всією довжиною | 3 |
| 17 | Горіх: помітність «сідельця» на шві | помірна | 5 |
| 18 | Горіх: ширина «сідельця» на шві | середнє | 5 |
| 19 | Горіх: глибина боріздки вздовж «сідельця» на шві | глибока | 7 |
| 20 | Горіх: структура поверхні шкаралупи | слабко борозенчаста | 1 |
| 21 | Горіх: товщина шкаралупи | середня | 5 |
| 22 | Горіх: міцність з'єднання двох половинок шкаралупи | слабка | 3 |
| 23 | Горіх: товщина первинної і вторинної роз'єднуючих перетинок | середні | 5 |
| 24 | Ядро: легкість видалення зі шкаралупи | легко | 3 |
| 25 | Ядро: за інтенсивністю основного забарвлення | світле | 3 |
| 26 | Ядро: за розміром | велике | 7 |
| 27 | Ядро: відсоткове відношення до загальної маси горіха | середнє | 5 |
| 28 | Час досягання | середній | 5 |
| 29 | Час листопаду | середній | 5 |
| 30 | Листок: здатність до обпадання | обпадає | 2 |
| 31 | Оплодень: здатність до обпадання | обпадає | 1 |
| 32 | Час розпускання вегетативних бруньок | м'як раннім і середнім | 4 |
| 33 | Час цвітіння чоловічих квіток | пізний | 7 |
| 34 | Час цвітіння жіночих квіток | середній | 5 |
| 35 | Час цвітіння чоловічих квіток порівняно із жіночими | пізніше (протогенічний) | 3 |

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Середня урожайність сорту становить 2,7 т/га, середній урожай з дерева – 22 кг, середня маса плоду – 16,9 г. Вихід ядра – 46,7 %, вміст жиру – 68,43 %, вміст білка – 14,15 %, вміст вуглеводів – 11,32 %. Зимостійкість та посухостійкість – 8 балів. Твердість шкаралупи – 5 балів. Настання знімальної стиглості – 204 доби. Рік вступу у плодоношення – п'ятий. Стійкість проти ураження бурою та чорною плямистістю – 9 балів. Стійкість проти пошкодження горіховою попелицею – 9 балів, горіховою міллю – 8 балів. Дегустаційна оцінка – 8 балів. Час досягання – середній.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп.