

Вид: Горошок посівний (ярий) *Vicia sativa* L.

Заявка №: 12047001 Назва сорту Південнобузька

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 26.02.2015 Патент №: 150173

Дата пріоритет 10.12.2012

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 150427

#### Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Сіянець: відношення довжини до ширини листочків (другого справжнього листка)	мале	3
2	Сіянець: антоціанове забарвлення основи стебла	наявне	9
3	Сіянець: інтенсивність антоціанового забарвлення на основи стебла	слабке	3
4	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення листків (напередодні цвітіння)	світле	3
5	Час початку цвітіння (30 % рослин)	середній	5
6	Стебло: опушення верхнього міжвузля	наявне	9
7	Стебло: антоціанове забарвлення пазух листків	відеутне або дуже слабке	1
8	Листок: форма верхівки листочків (на середній третині рослини)	увігнута	7
9	Листок: ширина листочків (як для 8)	середні	5
10	Прилистки: антоціанове забарвлення залозок	відеутне або дуже слабке	1
11	Квітка: забарвлення паруса	світло-фіолетовий	3
12	Біб: опушення	помірне	5
13	Біб: за довжиною	довгий	7
14	Біб: за шириною	середній	5
15	Біб: довжина дзьобика	середній	5
16	Біб: кількість насінних зачатків	середня кількість	5
17	Насіння: за розміром	велике	7
18	Насіння: за формою	прямокутне	3
19	Насіння: основне забарвлення насінної оболонки	сіро-зелене	1
20	Насіння: коричнева орнаментация	частково дифузна і частково різко виражена	4
21	Насіння: вираження коричневої орнаментации	помірне	5
22	Насіння: блакитно-чорна орнаментация	відеутня	1
23	Насіння: виявлення блакитно-чорної орнаментации	дуже слабке	1
24	Насіння: забарвлення сім'ядолей	оранжеве	2

#### Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність сухої речовини, ц/га	41	65,5	67,1
Гарантована прибавка до нац. стандарту, ц/га	0,6	-5,4	-7,6
Гарантована прибавка до нац. стандарту, %	1,4	-7,6	-3,8
Урожайність насіння, ц/га	13,6	18,5	20,1
Вегетаційний період, дб	57	63	57
Стійкість до вилягання, б	7,3	6,4	6,9
Стійкість до посухи, б	7,5	7,9	6,9
Стійкість до аскохітозу, б	9,0	9,0	9,0
Стійкість до іржі, б	8,5	9,0	9,0
Залистяність, %	73,1	60,5	54
Вміст сирого протеїну, %	17,8	19	19,3
Напрямок використання	кормовий	кормовий	кормовий

#### Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ