

**Вид:** Кукурудза звичайна Zea mays L.

**Заявка №:** 11004132      **Назва сорту** П8567

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:**

**Патент №:**

**Дата пріоритет**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:**

20.01.2015

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 150030

#### Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	середній	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочек у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочек	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від серединнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лишє для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лишє для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	короткий	3
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лишє для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лишє для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лишє для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лишє для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за ширину	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубовий	5
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лишє для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлущення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

#### Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	C	L	P
Урожайність, ц/га	47,8	77,2	
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га	2,7	-8,1	
Гарантована різниця до національного стандарту, %	6,0	-9,5	
Днів до досягнення	120	126	
Збиральна вологість зерна, %	18,5	22,8	

Вихід зерна при обмолоті, %	81	77
Стійкість до, бал		
посухи	7	9
полягання	9	9
пухирчастої сажки	9	9
Вміст, %		
білку	9,1	9,7
крохмалю	73,5	74,0

#### Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ