

Вид: Люцерна мінлива *Medicago x varia* Martyn

Заявка №: 10392002 Назва сорту Анжеліка

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.02.2015 Патент №: 150062

Дата пріоритет 30.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 150561

### Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: габітус восени першого року (2 тижні до рівнодення)	прямий	1
2	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після осіннього рівнодення (скошування за 2 тижні до рівнодення)	низька	3
3	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після осіннього рівнодення (скошування за 2 тижні після рівнодення)	ознака не визначалась	0
4	Рослина: за природною висотою навесні (один місяць після початку відростання другого року після сівби)	коротка	3
5	Час початку цвітіння	середній	5
6	Квітка: частота рослин з дуже темно-синьо-фіолетовими квітками	часто	7
7	Квітка: частота рослин із змішаними квітками	відсутні або дуже рідко	1
8	Квітка: частота рослин з кремовими, білими або жовтими квітками	відсутні або дуже рідко	1
9	Стебло: довжина найдовшого стебла за повного цвітіння (повністю сформоване суцвіття включно)	довге	7
10	Рослина: за природною висотою (через 3 тижні після 1-го скошування)	низька	3
11	Рослина: за природною висотою (через 3 тижні після 2-го скошування)	низька	3
13	Рослина: за природною висотою (після 4-го скошування)	ознака не визначалась	0
14	Рослина: за природною висотою (через 2 тижні після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби) (скошування за 2 тижні до рівнодення)	низька	3
15	Рослина: за природною висотою (через 6 тижнів після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби) (скошування за 2 тижні після рівнодення)	ознака не визначалась	0
16	Рослина: тенденція до зростання під час зими	ознака не визначалась	0
17	Стійкість до <i>Verticillium alboatrum</i>	ознака не визначалась	0
18	Стійкість до <i>Ditylenchus dipsaci</i>	ознака не визначалась	0
19	Стійкість до <i>Colletotrichum trifolii</i>	ознака не визначалась	0
20	Стійкість до <i>Phytophthora medicaginis</i>	ознака не визначалась	0
21	Стійкість до <i>Acyrtosiphon kondoi</i>	ознака не визначалась	0
22	Стійкість до <i>Therioaphis maculata</i>	ознака не визначалась	0
23	Стійкість до <i>Verticillium alboatrum</i>	ознака не визначалась	0
24	Стійкість до <i>Ditylenchus dipsaci</i>	ознака не визначалась	0

### Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність сухої речовини, ц/га	57,2	77,9	101,8
Гарантована різниця до нац.стандарту, ц/га	-8,5	-4,5	6,4
Гарантована різниця до нац.стандарту, %	-12,9	-5,4	6,7
Вегетаційний період, діб	52	64	92
Стійкість до вилягання, б	9,0	9,0	7,3
Стійкість до посухи, б	6,1	7,7	8,3
Стійкість до стеблової іржі, б	9,0	9,0	9,0
Перезимувало рослин, бал	7,6	7,7	4,3
Залистяність, %	24,2	26,9	34,7
Вміст сирого протеїну в сухій речовині, %	19,7	20,7	19,4
Стійкість до борошнистої роси	9,0	9,0	9,0
Напрямок використання	сінокісний	сінокісний	сінокісний

### Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Полісся