

Вид: Люцерна мінлива *Medicago x varia* Martyn

Заявка №: 11392001 Назва сорту Насолода

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритет 25.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

20.03.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 150562

### Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: габітус восени першого року (2 тижні до рівнодення)	напівпрямий	3
2	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після осіннього рівнодення (скошування за 2 тижні до рівнодення)	низька	3
3	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після осіннього рівнодення (скошування за 2 тижні після рівнодення)	низька	3
4	Рослина: за природною висотою навесні (один місяць після початку відростання другого року після сівби)	коротка	3
5	Час початку цвітіння	середній	5
6	Квітка: частота рослин з дуже темно-синьо-фіолетовими квітками	середня частота	5
7	Квітка: частота рослин із змішаними квітками	відсутні або дуже рідко	1
8	Квітка: частота рослин з кремовими, білими або жовтими квітками	відсутні або дуже рідко	1
9	Стебло: довжина найдовшого стебла за повного цвітіння (повністю сформоване суцвіття включно)	довге	7
10	Рослина: за природною висотою (через 3 тижні після 1-го скошування)	середня	5
11	Рослина: за природною висотою (через 3 тижні після 2-го скошування)	середня	5
12	Рослина: за природною висотою (через 3 тижні після 3-го скошування)	низька	3
13	Рослина: за природною висотою (після 4-го скошування)	низька	3
14	Рослина: за природною висотою (через 2 тижні після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби) (скошування за 2 тижні до рівнодення)	низька	3
15	Рослина: за природною висотою (через 6 тижнів після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби) (скошування за 2 тижні після рівнодення)	низька	3
16	Рослина: тенденція до зростання під час зими	стан спокою клас 5	5
17	Стійкість до <i>Verticillium alboatrum</i>	ознака не визначалась	0
18	Стійкість до <i>Ditylenchus dipsaci</i>	ознака не визначалась	0
19	Стійкість до <i>Colletotrichum trifolii</i>	ознака не визначалась	0
20	Стійкість до <i>Phytophthora medicaginis</i>	ознака не визначалась	0
21	Стійкість до <i>Acyrtosiphon kondoi</i>	ознака не визначалась	0
22	Стійкість до <i>Therioaphis maculata</i>	ознака не визначалась	0
23	Стійкість до <i>Verticillium alboatrum</i>	ознака не визначалась	0
24	Стійкість до <i>Ditylenchus dipsaci</i>	ознака не визначалась	0

### Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність сухої речовини, ц/га	89,4	87,3	99,7
Гарантована різниця до нац. стандарту, ц/га	9,1	3,2	4,7
Гарантована різниця до нац. стандарту, %	11,3	3,8	5
Вегетаційний період, дб	60	64	89
Стійкість до вилягання, б	9,0	9,0	7,0
Стійкість до вилягання, б	9,0	9,0	7,0
Стійкість посухи, б	8,2	7,0	7,0
Стійкість стеблової іржі, б	9,0	9,0	9,0
Стійкість до борошнистої роси, б	9,0	9,0	9,0
Перезимувало рослин, бал	-	9,0	5,0
Залистяність, %	-	38,1	34,9
Вміст сирого протеїну в сухій речовині, %	16,8	17,3	16,0
Напрямок використання	сінокісний	сінокісний	сінокісний

### Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп, Полісся