

Вид: Люцерна мінлива *Medicago x varia* Martyn  
 Заявка №: 09392001 Назва сорту Ніжність

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритет 26.11.2009

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

20.03.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 150560

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: габітус восени першого року (2 тижні до рівнодення)	прямий	1
2	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після осіннього рівнодення (скошування за 2 тижні до рівнодення)	низька	3
3	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після осіннього рівнодення (скошування за 2 тижні після рівнодення)	низька	3
4	Рослина: за природною висотою навесні (один місяць після початку відростання другого року після сівби)	коротка	3
5	Час початку цвітіння	середній	5
6	Квітка: частота рослин з дуже темно-синьо-фіолетовими квітками	рідко	3
7	Квітка: частота рослин із змішаними квітками	відсутні або дуже рідко	1
8	Квітка: частота рослин з кремовими, білими або жовтими квітками	відсутні або дуже рідко	1
9	Стебло: довжина найдовшого стебла за повного цвітіння (повністю сформоване суцвіття включно)	середнє	5
10	Рослина: за природною висотою (через 3 тижні після 1-го скошування)	низька	3
11	Рослина: за природною висотою (через 3 тижні після 2-го скошування)	низька	3
12	Рослина: за природною висотою (через 3 тижні після 3-го скошування)	низька	3
13	Рослина: за природною висотою (після 4-го скошування)	низька	3
14	Рослина: за природною висотою (через 2 тижні після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби) (скошування за 2 тижні до рівнодення)	середня	5
15	Рослина: за природною висотою (через 6 тижнів після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби) (скошування за 2 тижні після рівнодення)	низька	3
16	Рослина: тенденція до зростання під час зими	стан спокою клас 5	5
17	Стійкість до <i>Verticillium alboatrum</i>	ознака не визначалась	0
18	Стійкість до <i>Ditylenchus dipsaci</i>	ознака не визначалась	0
19	Стійкість до <i>Colletotrichum trifolii</i>	ознака не визначалась	0
20	Стійкість до <i>Phytophthora medicaginis</i>	ознака не визначалась	0
21	Стійкість до <i>Acyrtosiphon kondoi</i>	ознака не визначалась	0
22	Стійкість до <i>Therioaphis maculata</i>	ознака не визначалась	0
23	Стійкість до <i>Verticillium alboatrum</i>	ознака не визначалась	0
24	Стійкість до <i>Ditylenchus dipsaci</i>	ознака не визначалась	0

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність сухої речовини, ц/га	50,3	74,7	97,2
Гарантована різниця до нац. стандарту ц/га	-15,4	-7,7	1,8
Гарантована різниця до національного стандарту, %	-23	-9	2
Вегетаційний період, дб	53	64	90
Стійкість до вилягання, б	9,0	90,	7,3
Стійкість до посухи, б	6,1	7,7	7,7
Стійкість до стеблової іржі, б	9,0	9,0	9,0
Стійкість борошністої роси, б	9,0	9,0	9,0
Перезимувало рослин, бал	6,1	7,7	4,3
Залистяність, %	24,3	37,9	35,1
Вміст сирого протеїну в сухій речовині, %	20,9	20,4	20,2
Напрямок використання	сінокісний	сінокісний	сінокісний

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту**

Полісія