

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка №: 11007009 Назва сорту Мудрість одеська

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритет 24.02.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

20.03.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 150586

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|---|----------------------------|-----|
| 1 | Колеоптіль: ступінь антоціанового забарвлення | слабке | 3 |
| 2 | Рослина: форма куща (габітус) | пряmostoячий | 1 |
| 3 | Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок | відсутнє або дуже слабке | 1 |
| 4 | Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка | часто | 7 |
| 5 | Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів) | раннє | 3 |
| 6 | Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві | сильний | 7 |
| 7 | Колос: восковий наліт | сильний | 7 |
| 8 | Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі | сильний | 7 |
| 9 | Рослина: за висотою (стебло і колос) | середня | 5 |
| 10 | Соломина: виповнення (переріз між основою колосу і найближчим вузлом) | слабко виповнена | 3 |
| 11 | Колос: форма (вигляд збоку) | циліндрична | 2 |
| 12 | Колос: за щільністю | середній | 5 |
| 13 | Колос: за довжиною | середній | 5 |
| 14 | Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок | наявні остюки | 3 |
| 15 | Колос: довжина зубців / остюків на верхівці | дуже довгі | 9 |
| 16 | Колос: колір | білий або солом'яно-жовтий | 1 |
| 17 | Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла | слабке | 3 |
| 18 | Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса) | вузьке | 3 |
| 19 | Нижня колоскова луска: форма плеча | піднесене | 4 |
| 20 | Нижня колоскова луска: довжина зубця | середній | 5 |
| 21 | Нижня колоскова луска: форма зубця | ледь зігнутий | 3 |
| 22 | Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні | слабке | 3 |
| 23 | Нижня квітова луска першої квітки: форма зубця | ознака не визначалась | 0 |
| 24 | Зернівка: колір | червоний | 2 |
| 25 | Зернівка: забарвлення у фенолі | темне | 7 |
| 26 | Тип розвитку | озимий | 1 |
| 27 | Зернівка: за довжиною | середня | 5 |
| 28 | Зернівка: за шириною | середня | 5 |
| 29 | Зернівка: відношення довжина/ ширина | велике | 7 |
| 30 | Зернівка: за крупністю | крупна | 7 |
| 31 | Язичок: виявлення | середній | 5 |
| 32 | Нижня квітова луска : кіль | відсутній | 1 |
| 33 | Вушка: за формою | гострі | 2 |
| 34 | Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні | слабке | 3 |
| 35 | Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса) | овальна | 2 |

Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник | Значення | | |
|------------------------------------|----------|------|------|
| | С | Л | П |
| Урожайність, ц/га | 48,3 | 58,3 | 51,5 |
| +, - до нац. ст., ц/га | 4,1 | 0,9 | -0,5 |
| % | 9,3 | 1,6 | -1,0 |
| Максим. урожайність, ц/га | | 101 | |
| Вегетаційний період, днів | 262 | 269 | 277 |
| Висота рослин, см | 74 | 80 | 83 |
| Маса 1000 зерен, г | 40,3 | 43,3 | 44,0 |
| Зимостійкість: польова оцінка, бал | 7,6 | 7,8 | 8,8 |
| Стійкість до, бал: полягання | 8,3 | 8,2 | 8,7 |
| осипання | 8,9 | 8,5 | 8,8 |
| посухи | 7,8 | 7,9 | 8,8 |
| борошнистої роси | 9 | 9 | 9 |
| бурої іржі | 9 | 9 | 9 |
| фузаріозу | 9 | 9 | 9 |
| Вміст білку, % | 14,0 | 13,6 | 13,7 |
| Вміст клейковини, % | 29,7 | 28,7 | 29,1 |

| | | | |
|--|------|------|------|
| W, о.а. | 288 | 280 | 298 |
| Об'єм хліба, мл | 1110 | 1050 | 1030 |
| Напряв використання | с | ц | ц |
| Морозостійкість за проморожування, бал | 7,0 | | |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп