

Вид: Ріпак (озимий) Brassica napus L. oleifera

Заявка №: 10016073 Назва сорту СИ Кеседі

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.01.2015 Патент №: 150235

Дата пріоритет 03.12.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 150211

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5
3	Сім'ядоля: за шириною	широка	7
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	темний	7
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	багато	7
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	довгий	7
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	довгий	7
11	Рослина: час цвітіння	середній	5
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	середні	5
14	Квітка: ширина пелюсток	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	середня	5
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	довгий	7
19	Стручок: довжина зубця	середній	5
20	Стручок: довжина ніжки	середня	5
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	21,9	34,8	24,8
Прибавка до національного стандарту, ц/га	2,3	4,0	0,6
Прибавка до національного стандарту, %	11,7	13,0	2,5
Прибавка до умовного стандарту, ц/га	0,5	6,7	-2,2
Прибавка до умовного стандарту, %	2	24	-8
Стійкість до вилягання, бал	8,4	8,6	8,8
Стійкість до посухи, бал	8,1	7,6	8,8
Стійкість до осипання, бал	6,7	7,0	7,8
Зимостійкість, бал	6,6	7,6	8,3
Стійкість до ріпакового квіткоїду, бал	8,5	9,0	8,0
Стійкість до бактеріозу, бал	9,0	9,0	9,0
Стійкість до пероноспорозу, бал	9,0	9,0	9,0
Вміст білку, %	24,3	22,6	18,2
Вміст жиру, %	43,2	45,2	49,8
Вміст глюкозинолатів, %	0,6	0,6	0,5
Вміст ерукової кислоти, %	0,1	0,0	0,0

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп, Полісся