

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка №: 11018006 Назва сорту Діадема Поділля

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.03.2015 Патент №: 150203

Дата пріоритет 28.10.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 150607

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	середня	5
3	Рослина: тип росту	детермінантний	1
4	Рослина: форма росту	від прямої до напіврозлогої	2
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	сіре	1
6	Рослина: за висотою	від низької до середньої	4
7	Листок: пухирчатість	дуже сильна	9
8	Листок: форма бічного листочка (складного листка)	загостренойцевидна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірне	5
13	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5
14	Насіння: форма	видовжена	3
15	Насіння: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насіння: забарвлення, викликане реакцією пероксидази в насінній оболонці	ознака не визначалась	0
17	Насіння: забарвлення рубчика	світло-коричнє	3
18	Насіння: забарвлення сім'яної рубчика	як у насінній оболонки	1
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від раннього до середнього	4
20	Рослина: час досягання	ранній	3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	18,0	21,8	21,6
Прибавка до національного стандарту, ц/га	1,2	0,5	2,3
Прибавка до національного стандарту, %	7,1	2,3	11,9
Маса 1000 насінин, г	145,1	165,7	178,9
Висота рослин, см	65,1	70,9	75,9
Стійкість проти, бал:			
- вилягання	9,0	8,8	8,7
- осипання	8,7	8,8	9,0
- засухи	7,5	8,2	9,0
Висота прикріплення нижнього бобу, см	9,8	11,4	13,3
Стійкість проти, бал:			
- пероноспорозу	9,0	9,0	9,0
- аскохітозу	9,0	9,0	9,0
- бактеріозу	9,0	9,0	9,0
- септоріозу	9,0	9,0	9,0
- фузаріозу	9,0	9,0	9,0
Вміст білку, %	41,1	40,1	39,4
Вміст олії, %	21,9	21,6	20,4

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Полісся