

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка №: 11018020 Назва сорту Кобза

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.02.2015 Патент №: 150151

Дата пріоритет 29.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 150284

#### Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Рослина: тип росту	індетермінантний	4
4	Рослина: форма росту	від прямої до напіврозлогої	2
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричнєве	2
6	Рослина: за висотою	від низької до середньої	4
7	Листок: пухирчатість	помірна	5
8	Листок: форма бічного листочка (складного листка)	загостреноїцевидна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірне	5
13	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5
14	Насіння: форма	округло-видовжена	5
15	Насіння: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насіння: забарвлення, викликане реакцією пероксидази в насінній оболонці	ознака не визначалась	0
17	Насіння: забарвлення рубчика	темно-коричнєве	4
18	Насіння: забарвлення сім'яної рубчика	як у насінній оболонки	1
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3
20	Рослина: час досягання	ранній	3

#### Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	18,4	21,4	20,1
Прибавка до національного стандарту, ц/га	0,6	0,4	1,3
Прибавка до національного стандарту, %	3,4	1,9	6,9
Маса 1000 насінин, г	134,5	146,4	148,3
Висота рослин, см	62,4	66,0	68,8
Стійкість проти, бал:			
- вилягання	8,9	8,7	8,4
- осипання	8,2	8,8	9,0
- засухи	7,4	8,2	9,0
Висота прикріплення нижнього бобу, см	10,6	13,6	13,1
Стійкість проти, бал:			
- пероноспорозу	9,0	9,0	9,0
- аскохітозу	9,0	9,0	9,0
- бактеріозу	9,0	9,0	9,0
- септоріозу	9,0	9,0	9,0
- фузаріозу	9,0	9,0	9,0
Вміст білку, %	40,8	39,1	38,4
Вміст олії, %	21,3	20,7	20,1

#### Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Полісся