

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка №: 11018030 Назва сорту Марко

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритет 29.12.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

10.02.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 150285

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	середня	5
3	Рослина: тип росту	індетермінантний	4
4	Рослина: форма росту	пряма	1
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2
6	Рослина: за висотою	від середньої до високої	6
7	Листок: пухирчатість	дуже сильна	9
8	Листок: форма бічного листочка (складного листка)	широко яйцевидна	4
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	темне	7
13	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5
14	Насіння: форма	куляста	1
15	Насіння: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насіння: забарвлення, викликане реакцією пероксидази в насінній оболонці	ознака не визначалась	0
17	Насіння: забарвлення рубчика	сіре	1
18	Насіння: забарвлення сім'яної рубчика	як у насінній оболонки	1
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3
20	Рослина: час досягання	від раннього до середнього	4

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	19,7	24,2	24,2
Прибавка до національного стандарту, ц/га	1,9	3,2	5,4
Прибавка до національного стандарту, %	10,7	15,2	28,7
Маса 1000 насінин, г	147,0	162,5	170,5
Висота рослин, см	60,3	62,4	72,1
Стійкість проти, бал:			
- вилягання	9,0	9,0	9,0
- осипання	8,7	8,9	9,0
- засухи	7,7	8,5	9,0
Висота прикріплення нижнього бобу, см	8,9	11,1	13,7
Стійкість проти, бал:			
- пероноспорозу	9,0	9,0	9,0
- аскохітозу	9,0	9,0	9,0
- бактеріозу	9,0	9,0	9,0
- септоріозу	9,0	9,0	9,0
- фузаріозу	9,0	9,0	9,0
Вміст білку, %	44,5	44,0	44,1
Вміст олії, %	21,6	20,3	19,5

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп, Полісся