

Вид: Соя культурна Glycine max (L.) Merr.

Заявка №: 11018004 Назва сорту: Золоте руно

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритет: 28.10.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

24.02.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 150788

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення забарвлення	вісутне	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначалась	0
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3
4	Рослина: форма росту	напіврозлога	3
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричнєве	2
6	Рослина: за висотою	від низької до середньої	4
7	Листок: пухирчатість	помірна	5
8	Листок: форма бічного листочка (складного листка)	загостренойцевидна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
11	Квітка: забарвлення	біле	1
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірне	5
13	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5
14	Насіння: форма	округло-видовжена	5
15	Насіння: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насіння: забарвлення, викликане реакцією пероксидази в насінній оболонці	ознака не визначалась	0
17	Насіння: забарвлення рубчика	світло-коричнєве	3
18	Насіння: забарвлення сім'янки рубчика	інше	2
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від раннього до середнього	4
20	Рослина: час досягання	ранній	3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	21,7	23,3	20,6
Прибавка до національного стандарту, ц/га	3,9	2,3	1,8
Прибавка до національного стандарту, %	21,9	11,0	9,6
Маса 1000 насінин, г	130,5	141,6	158,3
Висота рослин, см	68,2	71,6	81,4
Стійкість проти, бал:			
- вилягання	8,6	8,3	8,1
- осипання	8,7	8,9	9,0
- засухи	7,8	8,2	9,0
Висота прикріплення нижнього бобу, см	10,2	12,2	13,9
Стійкість проти, бал:			
- пероноспорозу	9,0	9,0	9,0
- аскохітозу	9,0	9,0	9,0
- бактеріозу	9,0	9,0	9,0
- септоріозу	9,0	9,0	9,0
- фузаріозу	9,0	9,0	9,0
Вміст білку, %	39,9	39,4	39,1
Вміст олії, %	22,8	22,4	21,3

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп, Полісся