

Вид: Соя культурна Glycine max (L.) Merr.

Заявка №: 11018025 Назва сорту СВ Кавалер

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритет 01.12.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

27.04.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 150880

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	середня	5
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3
4	Рослина: форма росту	від прямої до напіврозлогої	2
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	сіре	1
6	Рослина: за висотою	від низької до середньої	4
7	Листок: пухирчатість	помірна	5
8	Листок: форма бічного листочка (складного листка)	загостренойцевидна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірне	5
13	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5
14	Насіння: форма	округло-видовжена	5
15	Насіння: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насіння: забарвлення, викликане реакцією пероксидази в насінній оболонці	ознака не визначалась	0
17	Насіння: забарвлення рубчика	жовте	2
18	Насіння: забарвлення сім'яної рубчика	як у насінній оболонки	1
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3
20	Рослина: час досягання	від дуже раннього до раннього	2

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	13,4	22,0	19,6
Прибавка до національного стандарту, ц/га	-2,9	1,5	0,3
Прибавка до національного стандарту, %	-17,8	7,3	1,5
Маса 1000 насінин, г	146,5	167,9	166,0
Висота рослин, см	65,6	66,6	75,7
Стійкість проти, бал:			
- вилягання	9,0	8,8	8,7
- осипання	9,0	9,0	9,0
- засухи	7,6	8,3	8,4
Висота прикріплення нижнього бобу, см	10,9	11,5	12,7
Стійкість проти, бал:			
- пероноспорозу	9,0	9,0	9,0
- аскохітозу	9,0	9,0	9,0
- бактеріозу	9,0	9,0	9,0
- септоріозу	9,0	9,0	9,0
- фузаріозу	9,0	9,0	9,0
Вміст білку, %	39,2	39,3	38,2
Вміст олії, %	21,3	21,0	20,9

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп