

Вид: Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L.

Заявка №: 10012032 Назва сорту Скрабл

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритет 03.12.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

27.03.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 150724

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: габітус	напіврозлогий	5
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	слабке	3
5	Рослина: частота рослин з викривленим прапорцевим листком	мало	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізніє	7
8	Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків	наявне	9
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	слабке	3
10	Колос: восковий наліт	помірний	5
11	Колос: положення у просторі	напівпрямє	3
12	Рослина: за висотою (стебло, колос з остюками)	низька	3
13	Колос: кількість рядів	два	1
14	Колос: форма	циліндрична	5
15	Колос: за щільністю	нешільний	3
16	Колос: за довжиною (без остюків)	короткий	1
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довші	3
18	Стрижень колосу: довжина першого сегменту	короткий	3
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	помірний	5
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	відхиленє	3
21	Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки	довша	3
22	Зернівка: довжина волосків основної щетинки	довгі	2
23	Зернівка: наявність плівки	наявна	9
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткові луски	слабке	3
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткові луски	відсутнє або дуже слабке	1
26	Зернівка: опушення вентральної борізки	відсутнє	1
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	слабко забарвлена	2
29	Тип розвитку	ярий	3
30	Колос: остюки	наявні	9
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5
32	Зернівка: форма	видовжено-еліптична	5
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткові луски	тонкозморшкувата	1
34	Тільки для пливчистих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткові луски	відсутнє	9
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткові луски до остюка	поступовий	2
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2
37	Вушка: охоплення соломини	повне	2
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса і верхнім вузлом)	слабко виповнена	3
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявна	9

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	26,3	40,5	36,7
Гарантована прибавка, ц/га	-1,1	0,6	2,9
Гарантована прибавка, %	-4,0	1,5	8,5
Вегетаційний період, діб	79	81	85
Висота рослин, см	54,9	61,2	61,5
Маса 1000 насінин, г	42,6	48,9	46,5
Стійкість до:			
- вилягання	8,9	8,8	8,7
- осипання	8,9	8,7	8,7

- посухи	6,3	7,6	8,2
- гельмінтоспориозу	8,3	7,9	7,5
- сажки	9,0	9,0	8,8
- борошнистої роси	8,3	8,6	8,5
- Якісні характеристики:			
вміст білку, %	13,8	13,3	11,9
вирівняність зерна, %	91,5	96,3	96,9
Напрям використання		зерн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп