

Вид: Дайкон *Raphanus sativus* L. convar. *acanthiformis* (Morel)

Заявка №: 11510001 Назва сорту Сокіл

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 26.03.2015 Патент №: 150174

Дата пріоритет 01.06.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.03.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 150795

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Плоідність	диплоїд	2
2	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотіля	відсутнє	1
3	Сім'ядолі: за розміром	великі	7
4	Листкова розетка: за шириною зростання біля основи	середня	5
5	Листок: положення у просторі	напіввисхідне	3
6	Листок: за довжиною	довгий	7
7	Листкова пластинка: за формою	вужкообернено-яйцевидна	1
8	Листкова пластинка: форма верхівки	округла	2
9	Листкова пластинка: відтінок зеленого кольору	відсутній	1
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
11	Листкова пластинка: кількість лопатей	багато	7
12	Листкова пластинка: надрізи країв	наявні	9
13	Листкова пластинка: глибина надрізів краю	глибокі	7
14	Листкова пластинка: опушення	слабке	3
15	Черешок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
16	Черешок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначалась	0
17	Коренеплід: за товщиною	середній	5
18	Коренеплід: товщина головного кореня	товстий	7
19	Коренеплід: за формою	оберненовужко-трикутний	8
20	Коренеплід: форма верхівки	увігнута	1
21	Коренеплід: форма основи	вужкозагострена	1
22	Коренеплід: забарвлення шкірки	однокольорове	1
23	Коренеплід: забарвлення верхньої частини	біле	1
24	Коренеплід: характер виявлення червоного кольору у верхній частині	ознака не визначалась	0
25	Лише для двокольорових сортів: Коренеплід: розмір білої верхівки	ознака не визначалась	0
26	Коренеплід: товщина кори	середня	5
27	Коренеплід: забарвлення м'якоті	матове біле	2
28	Час досягання	середній	5
29	Коренеплід: здатність до утворення дупла	відсутня або дуже слабка	1

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність - 47,0 т/га; тривалість періоду до досягання - 63 доби; середня маса плоду - 770 г; вміст сухої речовини 5,6%; вміст вітаміну С - 25,0%; ураженість хворобами: гниллю білою - 2,0%; гниллю мокрою - 4,2%; чорною ніжною - 3,2%.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:**

Степ, Лісостеп, Полісся