

Вид: Малина Rubus idaeus L.

Заявка №: 14296002 Назва сорту Джоан Джей

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритет

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

27.04.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 150846

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| №  | Ознака   | Проявлення                            | Код |
|----|--|---------------------------------------|-----|
| 1  | Рослина: габітус   | прямий                                | 1   |
| 2  | Рослина: кількість молодих пагонів   | середня кількість                     | 5   |
| 3  | Рослина: антоціанове забарвлення дуже молодих пагонів  | наявне                                | 9   |
| 4  | Рослина: інтенсивність антоціанового забарвлення дуже молодих пагонів  | сильне                                | 7   |
| 5  | Повністю розвинені пагони: наліт   | сильний                               | 7   |
| 6  | Повністю розвинені пагони: антоціанове забарвлення   | помірне                               | 5   |
| 7  | Повністю розвинені пагони: довжина міжвузлів   | середні                               | 5   |
| 8  | Повністю розвинені пагони: довжина вегетативної буньки   | середня                               | 5   |
| 9  | Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Пагони у стані спокою: за довжиною              | ознака не визначається                | 0   |
| 10 | Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Пагони поточного року: за довжиною             | довгі                                 | 7   |
| 11 | Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Пагони у стані спокою: забарвлення              | ознака не визначена                   | 0   |
| 12 | Рослина: шипи  | відсутні                              | 1   |
| 13 | Лише сорти з шипуватістю. Шипи: щільність розташування   | ознака не визначена                   | 0   |
| 14 | Лише сорти з шипуватістю. Шипи: розмір біля основи   | ознака не визначена                   | 0   |
| 15 | Лише сорти з шипуватістю. Шипи: за довжиною  | ознака не визначена                   | 0   |
| 16 | Лише сорти з шипуватістю. Шипи: забарвлення  | ознака не визначена                   | 0   |
| 17 | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку  | темне                                 | 7   |
| 18 | Листок: кількість листочків  | іноді три, іноді п'ять                | 2   |
| 19 | Листок: форма листочків у поперечному перерізі   | пряма                                 | 2   |
| 20 | Листок: рельєфність  | сильна                                | 7   |
| 21 | Листок: перекриття бічних листочків  | не перекриваються                     | 3   |
| 22 | Верхівковий листочок: за довжиною  | середній                              | 5   |
| 23 | Верхівковий листочок: за шириною   | середній                              | 5   |
| 24 | Квітконіжка: кількість шипів   | мало                                  | 3   |
| 25 | Квітконіжка: антоціанове забарвлення   | наявне                                | 9   |
| 26 | Квітконіжка: інтенсивність антоціанового забарвлення   | слабке                                | 3   |
| 27 | Квітка: за розміром  | велика                                | 7   |
| 28 | Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Пагони бічного плодоношення: положення          | ознака не визначається                | 0   |
| 29 | Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Пагони бічного плодоношення: за довжиною        | ознака не визначається                | 0   |
| 30 | Плід: за довжиною  | довгий                                | 7   |
| 31 | Плід: за шириною   | середній                              | 5   |
| 32 | Плід: відношення довжина/ширина  | середнє                               | 5   |
| 33 | Плід: загальна форма (вигляд з боку)   | конічна                               | 3   |
| 34 | Плід: розмір окремої кістянки  | середня                               | 5   |
| 35 | Плід: забарвлення  | темно-червоне                         | 5   |
| 36 | Плід: глянуватість   | помірна                               | 5   |
| 37 | Плід: за твердістю   | середній                              | 5   |
| 38 | Плід: схильність до утворення квітколожа   | помірна                               | 5   |
| 39 | Плід: тип основного плодоношення   | лише на пагонах поточного року восени | 3   |
| 40 | Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Рослина: час набубнявіння вегетативної бруньки  | ознака не визначається                | 0   |
| 41 | Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Час появи пагонів                              | ранній                                | 3   |
| 42 | Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Час початку цвітіння на пагонах минулого року   | ознака не визначається                | 0   |
| 43 | Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Час початку цвітіння на пагонах поточного року | ранній                                | 3   |
| 44 | Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Час початку досягання на пагонах минулого року  | ознака не визначається                | 0   |

|    |  |                        |   |
|----|--|------------------------|---|
| 45 | Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Час початку достигання на пагонах поточного року       | ранній                 | 3 |
| 46 | Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Тривалість урожайного сезону на пагонах минулого року   | ознака не визначається | 0 |
| 47 | Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Тривалість урожайного сезону на пагонах поточного року | тривалий               | 7 |

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Середня врожайність становить 20 т/га, урожай з куша 2,5 кг, середня маса плоду 5,0 г. Зимостійкість 7, посухостійкість 6 балів. Стійкість до ураження антракнозом, білою та пурпуровою плямистістю 6 балів, іржею 7, до пошкодження малиновим довгоносиком та попелицею 6 балів. Вміст сухої речовини у плодах 10,8%, загального цукру 9,1%, вітаміну С 27 мг%, загальна кислотність 2,15%. Напрямок використання універсальний. Дегустаційна оцінка свіжих ягід 7, транспортабельність 7 балів. Час достигання ранній.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:**

Полісся, Лісостеп, Степ, закритий ґрунт