

Вид: Кабачок Cucurbita pepo L.var. giromontia Duch.

Заявка №: 12026008 **Назва сорту** Ангеліна

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритет

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

26.01.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 150004

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: форма сім'ядолей	еліптична	2
2	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей	світле	3
3	Паросток: форма поперечного перерізу сім'ядолей	пряма	2
4	Рослина: габітус	кущовий	1
5	Рослина: галуження	наявне	9
6	Рослина: галуження стебла	помірне	5
7	Тільки для кущових сортів. Рослина: положення черешка (за виключенням нижніх зовнішніх листків)	напівпряме	3
8	Стебло: забарвлення	цілком зелене	1
9	Стебло: інтенсивність зеленого забарвлення	світле	3
10	Стебло: крапчастість	відсутня	1
11	Стебло: вусики	відсутні абоrudimentarnі	1
12	Листкова пластинка: за розміром	середня	5
13	Листкова пластинка: розсіченість	помірна	5
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірне	5
15	Листкова пластинка: срібляста плямистість	відсутня	1
16	Листкова пластинка: поверхня, охоплена сріблястою плямистістю	ознака не визначалась	0
17	Черешок: за довжиною	середній	5
18	Черешок: кількість шипів	середня кількість	5
19	Жіноча квітка: кільце всередині віночка	наявне	9
20	Жіноча квітка: забарвлення кільца всередині віночка	зелене	2
21	Лиш сорти з зеленим забарвленням кільца всередині віночка. Жіноча квітка: інтенсивність забарвлення	слабке	3
22	Чоловічка квітка: вираження кільца всередині віночка	наявне	9
23	Чоловічка квітка: забарвлення кільца всередині віночка	жовте	1
24	Лиш сорти з зеленим забарвленням кільца всередині віночка. Чоловічка квітка: інтенсивність забарвлення кільца всередині віночка	ознака не визначається	0
25	Лиш сорти типу цукіні. Молодий плід: відношення довжини до максимального діаметра	середнє	5
26	Лиш сорти типу цукіні та цукіні кулястого. Молодий плід: переважна форма	циліндрична	5
27	Молодий плід: основне забарвлення шкірки (за винятком забарвлення ребер або борозенок)	зелене	4
28	Лиш сорти з жовтим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 27)	ознака не визначається	0
29	Лиш сорти із зеленим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 27)	світле	3
30	Плід: переважна форма	циліндрична	9
31,1	Лиш сорти типу патисон. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0
31,2	Лиш сорти типу жолудь. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0
31,3	Лиш сорти типу з підкою. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0
31,4	Лиш сорти типу цукіні. Плід: за довжиною	короткий	3
32,1	Лиш сорти типу патисон. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0
32,2	Лиш сорти типу жолудь. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0
32,3	Лиш сорти типу цукіні. Плід: максимальний діаметр	малий	3
33,1	Лиш сорти типу патисон. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0
33,2	Лиш сорти типу жолудь. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0
33,3	Лиш сорти типу цукіні. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	мале	3
34,1	Лиш сорти типу гарбуз. Плід: за розміром	ознака не визначається	0
34,2	Лиш сорти типу Rondini. Плід: за розміром	ознака не визначається	0
35	Лиш сорти типу мініатюрний гарбуз. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0
36	Лиш сорти типу патисон. Плід: вираженість екваторіального краю	ознака не визначається	0
37	Лиш сорти типу патисон. Плід: позиція (положення) екваторіального краю	ознака не визначається	0
38	Лиш сорти типу патисон. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0
39	Лиш сорти типу патисон. Плід: форма маточкового кінця	ознака не визначається	0

40	Лиш сорти типу жолудь. Плід: положення найбільшого діаметра	ознака не визначається	0
41	Лиш сорти типу жолудь. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0
42	Лиш сорти типу з шийкою. Плід: довжина шийки	ознака не визначається	0
43	Лиш сорти типу з шийкою. Плід: відношення діаметра шийки до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0
44	Лиш сорти типу з шийкою. Плід: викривлення шийки	ознака не визначається	0
45	Лиш сорти типу з шийкою і цукіні. Плід: форма маточкового кінця	округла	1
46	Плід: борозенки	відсутні	1
47	Плід: глибина борозенок	ознака не визначалась	0
48	Плід: ребра	наявні	9
49	Плід: ступінь виявлення ребер	помірно	5
50	Плід: основне забарвлення шкірки (забарвлення плям, крапок, смужок і смут не брати до уваги)	біле	1
51	Лиш сорти з жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 50)	ознака не визначається	0
52	Лиш сорти з жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 50)	ознака не визначається	0
53	Лиш сорти з основним подвійним забарвленням шкірки. Плід: поширення зеленого забарвлення	ознака не визначається	0
54	Плід: смужки на боріздах	відсутні	1
55	Плід: забарвлення смужок на боріздах	ознака не визначалась	0
56	Плід: забарвлення ребер відносно основного забарвлення шкірки (як для 50)	однакове	1
57	Плід: плямистість	відсутня	1
58	Плід: переважний розмір плям	ознака не визначалась	0
59	Плід: вторинне зелене забарвлення між ребрами (плями до уваги не беруть)	відсутнє	1
60	Плід: інтенсивність вторинного зеленого забарвлення між ребрами	ознака не визначалась	0
61	Плід: поширення вторинного зеленого забарвлення між ребрами	ознака не визначалась	0
62	Плід: бородавки на шкірці	відсутні	1
63	Плід: кількість бородавок на шкірці	ознака не визначалась	0
64	Плід: розмір квіткового рубця	середній	5
65	Плід: довжина плодоніжки	середня	5
66	Плід: забарвлення плодоніжки	зелене	2
67	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плодоніжки	світле	3
68	Плід: крапчастість (плямистість) плодоніжки	наявна	9
69	Стиглий плід: основне забарвлення шкірки (забарвлення крапок, плям, смут і смужечок не брати до уваги)	жовте	4
70	Стиглий плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (лише жовтого чи оранжевого)	світле	3
71	Стиглий плід: вторинне забарвлення (як для 69)	ознака не визначалась	0
72	Стиглий плід: зелений відтінок (лише білого і кремового)	відсутній	1
73	Стиглий плід: переважаючий зелений відтінок (як для 72)	ознака не визначалась	0
74	Стиглий плід: забарвлення м'якоті	кремове	1
75	Стиглий плід: здерев'яниня шкірки	наявні	9
76	Стиглий плід: структура м'якоті	не волокниста	1
77	Насіння: за розміром	середня	5
78	Насіння: форма	еліптична	5
79	Насіння: лушпиння	наявні	9
80	Насіння: наявнє лушпиння	повністю розвинене	2
81	Насіння: за кольором	кремове	2

За інформацією наданою заявитником:

- показники господарської придатності

Товарний урожай 32 т/га, вміст сухої речовини 5,3%, тривалість періоду до настання технічної стигlostі 88 діб.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся.