

Вид: Квасоля звичайна (зернова) Phaseolus vulgaris L.

Заявка №: 09087002 Назва сорту Ясочка

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритет 29.05.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

05.02.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 150110

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: антоціанове забарвлення гіпокотіля	відсутнє	1
2	Рослина: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотіля	ознака не визначається	0
3	Рослина: тип росту	виткий	2
4	Виткі сорти. Рослина: архітектоніка	пірамідальна	1
5	Кущові сорти. Рослина: тип росту	ознака не визначається	0
6	Кущові сорти. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
7	Виткі сорти. Рослина: початок завивання (80% рослин)	середній	5
8	Виткі сорти. Рослина: швидкість завивання	помірна	5
9	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	світле	3
10	Листок: зморшкуватість	помірна	5
11	Верхівковий листочок: за розміром	середній	5
12	Верхівковий листочок: форма	від трикутної до округлої	2
13	Верхівковий листочок: довжина верхівки	коротка	1
14	Кущові сорти. Суцвіття: положення (за повного цвітіння)	ознака не визначається	0
15	Квітка: розмір приквітка	середній	5
16	Квітка: колір паруса	фіолетовий	4
17	Квітка: колір крил	фіолетовий	4
18	Кущові сорти. Біб: за довжиною (за виключенням гачка)	ознака не визначається	0
19	Виткі сорти. Біб: за довжиною (як для 18)	середній	5
20	Біб: за шириною	вузький	3
21	Біб: за товщиною	тонкий	3
22	Біб: форма поперечного перерізу (через насінину)	овальна	2
23	Біб: відношення товщини до ширини	мале	3
24	Біб: основний колір	зелений	2
25	Біб: інтенсивність основного кольору	помірний	5
26	Біб: вторинний колір	відсутній	1
27	Біб: колір вторинного забарвлення	ознака не визначається	0
28	Біб: щільність плям вторинного кольору	ознака не визначається	0
29	Біб: волокнистість вентрального (черевного) шва	наявна	9
30	Біб: ступінь вигину	слабкий	3
31	Біб: форма вигину	увігнута	1
32	Біб: форма верхівки (за виключенням гачка)	загострена	1
33	Біб: довжина гачка	середній	5
34	Біб: вигин гачка	відсутній або дуже слабкий	1
35	Біб: характер поверхні	гладенька або злегка зморшкувата	1
36	Біб: звуження (в сухому стані)	помірне	2
37	Насіння: маса 1000 насінин	низька	3
38	Насінина: форма поздовжнього розтину	від округлої до еліптичної	2
39	Сорти з ниркоподібним насінням. Насінина: ступінь вигину	ознака не визначається	0
40	Насінина: форма поперечного перерізу	еліптична	3
41	Насінина: поперечний переріз за шириною	середній	5
42	Насінина: за довжиною	коротка	3
43	Насінина: кількість кольорів	один	1
44	Насінина: основний колір (найбільша зона)	білий	1
45	Насінина: вторинний колір	ознака не визначається	0
46	Насінина: розподіл переважаючого вторинного кольору	ознака не визначається	0
47	Насінина: жилкування	помірне	5
48	Час цвітіння (50% рослин мають щонайменше одну квітку)	середній	5
49,1	Стійкість до антракнозу квасолі (Colletotrichum lindemuthianum): Паса 6	ознака не визначалась	0
49,2	Стійкість до антракнозу квасолі (Colletotrichum lindemuthianum): Паса Kappa	ознака не визначалась	0
50	Стійкість до вірусної мозаїки квасолі Bean Common Mosaic Necrosis Virus (BCMNV)	ознака не визначалась	0

51	Стойкість до кутастої бактеріальної плямистості (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>phaseolicola</i>): Раса 6	ознака не визначалась	0
52	Стойкість до звичайної плямистості квасолі (<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i>), ізолят 422	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність зерна сорту Ясочка (за стандартної вологості 14 %) становить 2,78 т/га з вмістом сирого протеїну 25,1 %. При тривалості вегетаційного періоду 87 діб рослини мають висоту прикріплення першого бобу - 13,0 см.

Посухостійкість становить 7 балів, а показники стійкості до вилягання, та осипання по 9 балів.

Ураженість рослин хворобами (антракноз) досягає 9-ти балів.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Лісостеп