

Вид: Морква *Daucus carota* L.

Заявка №: 13109002 Назва сорту Мацурі

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.02.2015 Патент №: 150063

Дата пріоритет 14.02.2013

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

04.02.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 150180

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Листки: ширина розетки	середня	5
2	Листок: за положенням у просторі	горизонтальний	5
3	Листок: за довжиною (разом із черешком)	середній	5
4	Листок: розсіченість	тонка	3
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
6	Листок: антоціанове забарвлення черешка	відсутнє	1
7	Коренеплід: за довжиною	середній	5
8	Коренеплід: за шириною	середній	5
9	Коренеплід: відношення довжина/ширина	середнє	5
10	Коренеплід: форма у поздовжньому розрізі	вузькотрикутна	4
11	Сорти оцінені в проміжку 4 і 6 для ознаки 10: Коренеплід: тенденція до конічної форми	сильна	7
12	Коренеплід: форма плеча	плескато-округла	2
13	Коренеплід: форма кінчика (повністю сформований)	ледь загострена	2
14	Коренеплід: колір поверхні	оранжевий	3
15	За винятком сортів з білим зовнішнім забарвленням коренеплоду. Коренеплід: інтенсивність забарвлення поверхні	помірна	5
16	Коренеплід: антоціанове забарвлення поверхні плеча	відсутнє	1
17	Коренеплід: розмір зеленого забарвлення поверхні плеча	малий	3
18	Коренеплід: наявність борозенок на поверхні	слабко виражені	3
19	Коренеплід: діаметр серцевини відносно загального діаметра	середній	5
20	Коренеплід: забарвлення серцевини	оранжеве	3
21	За винятком сортів з білою серцевиною. Коренеплід: інтенсивність забарвлення серцевини	сильне	7
22	Коренеплід: забарвлення шкірки	оранжеве	3
23	За винятком сортів з білою шкіркою. Коренеплід: інтенсивність забарвлення шкірки	помірне	5
24	Коренеплід: забарвлення серцевини порівняно із забарвленням шкірки	темніша	3
25	Коренеплід: зелене забарвлення внутрішньої частини верхівки (у поздовжньому розрізі)	відсутнє або дуже слабке	1
26	Коренеплід: надземна частина	мала	3
27	Тільки сорти з тупими верхівками. Коренеплід: час розвитку заокругленої верхівки	ранній	3
28	Коренеплід: час забарвлення верхівки	середній	5
29	Рослина: тенденція до стрікування	слабка	3
30	Рослина: висота першого зонтика під час його цвітіння	ознака не визначалась	0
31	Рослина: частка рослин з чоловічою стерильністю	відсутні або дуже мало	1
32	Рослина: тип чоловічої стерильності	коричневі пиляки	1

**За інформацією наданою заявником:**

- показники господарської придатності

Товарна урожайність 80 т/га, тривалість періоду до досягання 110 діб, вміст сухої речовини 9,4%, вміст загального цукру 7,2%.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:**

Степ, Лісостеп.