

Вид: Морква *Daucus carota* L.

Заявка №: 11034005 Назва сорту Ньюхолл

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритет

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

05.02.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 150170

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Листки: ширина розетки	середня	5
2	Листок: за положенням у просторі	горизонтальний	5
3	Листок: за довжиною (разом із черешком)	середній	5
4	Листок: розсіченість	груба	7
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
6	Листок: антоціанове забарвлення черешка	відсутнє	1
7	Коренеплід: за довжиною	середній	5
8	Коренеплід: за шириною	середній	5
9	Коренеплід: відношення довжина/ширина	середнє	5
10	Коренеплід: форма у поздовжньому розрізі	вузькотрикутна	4
11	Сорти оцінені в проміжку 4 і 6 для ознаки 10: Коренеплід: тенденція до конічної форми	сильна	7
12	Коренеплід: форма плеча	плескато-округла	2
13	Коренеплід: форма кінчика (повністю сформований)	сильно загострена	3
14	Коренеплід: колір поверхні	червоний	5
15	За винятком сортів з білим зовнішнім забарвленням коренеплоду. Коренеплід: інтенсивність забарвлення поверхні	помірна	5
16	Коренеплід: антоціанове забарвлення поверхні плеча	відсутнє	1
17	Коренеплід: розмір зеленого забарвлення поверхні плеча	середній	5
18	Коренеплід: наявність борозенок на поверхні	слабко виражені	3
19	Коренеплід: діаметр серцевини відносно загального діаметра	середній	5
20	Коренеплід: забарвлення серцевини	оранжеве	3
21	За винятком сортів з білою серцевиною. Коренеплід: інтенсивність забарвлення серцевини	помірне	5
22	Коренеплід: забарвлення шкірки	оранжеве	3
23	За винятком сортів з білою шкіркою. Коренеплід: інтенсивність забарвлення шкірки	помірне	5
24	Коренеплід: забарвлення серцевини порівняно із забарвленням шкірки	темніша	3
25	Коренеплід: зелене забарвлення внутрішньої частини верхівки (у поздовжньому розрізі)	слабке	3
26	Коренеплід: надземна частина	мала	3
27	Тільки сорти з тупими верхівками. Коренеплід: час розвитку заокругленої верхівки	середній	5
28	Коренеплід: час забарвлення верхівки	середній	5
29	Рослина: тенденція до стрікування	слабка	3
30	Рослина: висота першого зонтика під час його цвітіння	середній	5
31	Рослина: частка рослин з чоловічою стерильністю	відсутні або дуже мало	1
32	Рослина: тип чоловічої стерильності	коричневі пиляки	1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна урожайність 75 т/га, тривалість періоду до досягання 118 діб, вміст сухої речовини 7,7%, вміст загального цукру 5%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся.