

**Вид:** Патисон Cucurbita pepo var. melopepo (L.) Harz

**Заявка №:** 12162001

**Назва сорту** СТАРШИП

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:**

**Патент №:**

**Дата пріоритет**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:**

26.01.2015

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 150048

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

<b>№</b>	<b>Ознака</b>	<b>Проявлення</b>	<b>Код</b>
1	Паросток: форма сім'ядолей	широкоеліптична	3
2	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей	світле	3
3	Паросток: форма поперечного перерізу сім'ядолей	випукла	3
4	Рослина: габітус	купсовий	1
5	Рослина: галуження	відсутнє	1
6	Рослина: галуження стебла	ознака не визначалась	0
7	Тільки для кущових сортів. Рослина: положення черешка (за виключенням нижніх зовнішніх листків)	від прямого до напівпрямого	2
8	Стебло: забарвлення	цілком зелене	1
9	Стебло: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
10	Стебло: крапчастість	відсутня	1
11	Стебло: вусики	відсутні абоrudimentarnі	1
12	Листкова пластинка: за розміром	середня	5
13	Листкова пластинка: розсіченість	відсутня або дуже мілка	1
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірне	5
15	Листкова пластинка: срібляста плямистість	відсутня	1
16	Листкова пластинка: поверхня, охоплена сріблястою плямистістю	ознака не визначалась	0
17	Черешок: за довжиною	довгий	7
18	Черешок: кількість шилів	кілька	3
19	Жіноча квітка: кільце всередині віночка	відсутнє	1
20	Жіноча квітка: забарвлення кільца всередині віночка	ознака не визначалась	0
21	Лиш сорти з зеленим забарвленням кільца всередині віночка. Жіноча квітка: інтенсивність забарвлення	ознака не визначається	0
22	Чоловіча квітка: вираження кільца всередині віночка	відсутнє	1
23	Чоловіча квітка: забарвлення кільца всередині віночка	ознака не визначалась	0
24	Лиш сорти з зеленим забарвленням кільца всередині віночка. Чоловіча квітка: інтенсивність забарвлення кільца всередині віночка	ознака не визначається	0
25	Лиш сорти типу цукіні. Молодий плід: відношення довжини до максимального діаметра	ознака не визначається	0
26	Лиш сорти типу цукіні та цукіні кулястого. Молодий плід: переважна форма	ознака не визначається	0
27	Молодий плід: основне забарвлення шкірки (за винятком забарвлення ребер або борозенок)	зелене	4
28	Лиш сорти з жовтим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 27)	ознака не визначається	0
29	Лиш сорти із зеленим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 27)	темне	7
30	Плід: переважна форма	дископодібна	1
31,1	Лиш сорти типу патисон. Плід: за довжиною	довгий	7
31,2	Лиш сорти типу жолудь. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0
31,3	Лиш сорти типу з шийкою. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0
31,4	Лиш сорти типу патисон. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0
32,1	Лиш сорти типу патисон. Плід: максимальний діаметр	великий	7
32,2	Лиш сорти типу жолудь. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0
32,3	Лиш сорти типу цукіні. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0
33,1	Лиш сорти типу патисон. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	середнє	5
33,2	Лиш сорти типу жолудь. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0
33,3	Лиш сорти типу цукіні. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0
34,1	Лиш сорти типу гарбуз. Плід: за розміром	ознака не визначається	0
34,2	Лиш сорти типу Rondini. Плід: за розміром	ознака не визначається	0
35	Лиш сорти типу мініатюрний гарбуз. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0
36	Лиш сорти типу патисон. Плід: вираженість екваторіального краю	помірна	5
37	Лиш сорти типу патисон. Плід: позиція (положення) екваторіального краю	посередині	1
38	Лиш сорти типу патисон. Плід: форма плодоніжки	пряма	1
39	Лиш сорти типу патисон. Плід: форма маточкового кінця	удавлений	2

40	Лиш сорти типу жолудь. Плід: положення найбільшого діаметра	ознака не визначається	0
41	Лиш сорти типу жолудь. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0
42	Лиш сорти типу з шийкою. Плід: довжина шийки	ознака не визначається	0
43	Лиш сорти типу з шийкою. Плід: відношення діаметра шийки до найбільшого	ознака не визначається	0
44	Лиш сорти типу з шийкою. Плід: викривлення шийки	ознака не визначається	0
45	Лиш сорти типу з шийкою і цукіні. Плід: форма маточкового кінця	ознака не визначається	0
46	Плід: борозенки	відсутні	1
47	Плід: глибина борозенок	ознака не визначалась	0
48	Плід: ребра	відсутні	1
49	Плід: ступінь виявлення ребер	ознака не визначалась	0
50	Плід: основне забарвлення шкірки (забарвлення плям, крапок, смужок і смуг не брати до уваги)	зелене	4
51	Лиш сорти з жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 50)	ознака не визначається	0
52	Лиш сорти з жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 50)	ознака не визначається	0
53	Лиш сорти з основним подвійним забарвленням шкірки. Плід: поширення зеленого забарвлення	ознака не визначається	0
54	Плід: смужки на боріздах	відсутні	1
55	Плід: забарвлення смужок на боріздах	ознака не визначалась	0
56	Плід: забарвлення ребер відносно основного забарвлення шкірки (як для 50)	ознака не визначалась	0
57	Плід: плямистість	відсутня	1
58	Плід: переважний розмір плям	ознака не визначалась	0
59	Плід: вторинне зелене забарвлення між ребрами (плями до уваги не беруть)	відсутнє	1
60	Плід: інтенсивність вторинного зеленого забарвлення між ребрами	ознака не визначалась	0
61	Плід: поширення вторинного зеленого забарвлення між ребрами	ознака не визначалась	0
62	Плід: бородавки на шкірці	наявні	9
63	Плід: кількість бородавок на шкірці	дуже мало	1
64	Плід: розмір квіткового рубця	дуже великий	9
65	Плід: довжина плодоніжки	довга	7
66	Плід: забарвлення плодоніжки	зелене	2
67	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плодоніжки	темне	7
68	Плід: крапчастість (плямистість) плодоніжки	відсутня	1
69	Стиглий плід: основне забарвлення шкірки (забарвлення крапок, плям, смут і смужечок не брати до уваги)	темно-зелене	7
70	Стиглий плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (лише жовтого чи оранжевого)	ознака не визначалась	0
71	Стиглий плід: вторинне забарвлення (як для 69)	ознака не визначалась	0
72	Стиглий плід: зелений відтінок (лише білого і кремового)	наявний	9
73	Стиглий плід: переважаючий зелений відтінок (як для 72)	сильний	7
74	Стиглий плід: забарвлення м'якоті	кремове	1
75	Стиглий плід: здерев'яніння шкірки	відсутнє	1
76	Стиглий плід: структура м'якоті	не волокниста	1
77	Насініна: за розміром	середня	5
78	Насініна: форма	широкоеліптична	7
79	Насініна: лушпиння	наявне	9
80	Насініна: наявне лушпиння	повністю розвинене	2
81	Насініня: за кольором	кремове	2

За інформацією наданою заявитником:

- показники господарської придатності

Товарна урожайність 1,64 т/га, тривалість періоду збирання плодів 42 доби, вміст сухої речовини 61%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся.