

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка №: 14115027 Назва сорту ДР0141ТХ

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритет

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

16.06.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 150923

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| №    | Ознака  | Проявлення             | Код |
|------|---|------------------------|-----|
| 1    | Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила  | наявне                 | 9   |
| 2    | Рослина: тип розвитку   | індетермінантний       | 2   |
| 3    | Тільки детермінантні сорти: Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)   | ознака не визначається | 0   |
| 4    | Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині   | слабке                 | 3   |
| 5    | Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям                              | середнє                | 5   |
| 6    | Листок: за положенням (у середній третині рослини)  | похилий                | 7   |
| 7    | Листок: за довжиною   | середній               | 5   |
| 8    | Листок: за шириною  | середній               | 5   |
| 9    | Листок: за розсіченістю   | двічі перистий         | 2   |
| 10   | Листок: розмір листочків (у середній частині листка)  | середній               | 5   |
| 11   | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення  | помірне                | 5   |
| 12   | Листок: глянуватість (як для б)   | помірна                | 5   |
| 13   | Листок: пухирчастість (як для б)  | помірна                | 5   |
| 14   | Листок: розмір пухирів (як для б)   | середні                | 5   |
| 15   | Листок: положення черешка листочків відносно головної осі   | піднесене              | 3   |
| 16   | Суцвіття: інтенсивність галуження (другої і третьої китиці)   | в основному 1 гілка    | 1   |
| 17   | Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)   | відсутня               | 1   |
| 18   | Квітка: опушення приймочки  | наявне                 | 9   |
| 19   | Квітка: за кольором   | жовта                  | 1   |
| 20   | Квітконіжка: відокремлюючий шар   | наявний                | 9   |
| 21   | Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки) | середня                | 5   |
| 22   | Плід: за розміром   | дуже маленький         | 1   |
| 23   | Плід: відношення довжини до діаметра  | велике                 | 7   |
| 24   | Плід: форма у повздовжньому розрізі   | плескато-округла       | 2   |
| 25   | Плід: ребристість біля плодоніжки   | сильна                 | 7   |
| 26   | Плід: форма поперечного перерізу  | кругляста              | 2   |
| 27   | Плід: поглиблення біля плодоніжки   | милке                  | 3   |
| 28   | Плід: розмір рубця плодоніжки   | маленький              | 3   |
| 29   | Плід: розмір квіткового рубця   | маленький              | 3   |
| 30   | Плід: форма кінця плоду   | плеската               | 3   |
| 31   | Плід: розмір плаценти у поперечному перерізі  | середній               | 5   |
| 32   | Плід: за товщиною перикарпу   | середній               | 5   |
| 33   | Плід: кількість камер   | тільки 2               | 1   |
| 34   | Плід: зелене плече (перед досяганням)   | відсутнє               | 1   |
| 35   | Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)   | ознака не визначається | 0   |
| 36   | Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (як для 34)  | ознака не визначається | 0   |
| 37   | Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (як для 34)  | помірне                | 5   |
| 38   | Плід: колір за досягання  | коричнюватий           | 6   |
| 39   | Плід: колір м'якоті (як для 38)   | червоний               | 5   |
| 40   | Плід: за твердістю  | твердий                | 7   |
| 41   | Плід: строк лежкості  | помірний               | 5   |
| 42   | Час цвітіння  | середній               | 5   |
| 43   | Час досягання   | пізній                 | 7   |
| 44   | Плід: вміст сухої речовини (за досягання)   | ознака не визначалась  | 0   |
| 45   | Наявність сріблястості  | ознака не визначалась  | 0   |
| 46   | Стійкість до <i>Meloidogyne incognita</i>   | наявна                 | 9   |
| 47   | Стійкість до <i>Verticillium dahliae</i> : Pasa 0   | наявна                 | 9   |
| 48,1 | Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Pasa 0                               | наявна                 | 9   |
| 48,2 | Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Pasa 1                               | наявна                 | 9   |
| 49   | Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>                                | наявна                 | 9   |
| 50,1 | Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Pasa 0  | наявна                 | 9   |

|      |  |                       |   |
|------|--|-----------------------|---|
| 50,2 | Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи А    | наявна                | 9 |
| 50,3 | Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи В    | наявна                | 9 |
| 50,4 | Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи С    | наявна                | 9 |
| 50,5 | Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи D    | наявна                | 9 |
| 50,6 | Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи Е    | наявна                | 9 |
| 51,1 | Стійкість до Tomato Mosaic Virus: Патотипу 0 | наявна                | 9 |
| 51,2 | Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1        | наявна                | 9 |
| 51,3 | Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 2        | наявна                | 9 |
| 51,4 | Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1 - 2    | ознака не визначалась | 0 |
| 52   | Стійкість до Phytophthora infestans          | ознака не визначалась | 0 |
| 53   | Стійкість до Pyrenochaeta lycopersici        | наявна                | 9 |
| 54   | Стійкість до Stemphylium spp.                | ознака не визначалась | 0 |
| 55   | Стійкість до Pseudomonas syringae pv. Tomato | ознака не визначалась | 0 |
| 56   | Стійкість до Ralstonia solanacearum          | ознака не визначалась | 0 |
| 57   | Стійкість до Tomato Yellow Leaf Curl Virus   | ознака не визначалась | 0 |
| 58   | Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus       | ознака не визначалась | 0 |
| 59   | Стійкість до Leveillula taurica              | ознака не визначалась | 0 |
| 60   | Стійкість до Oidium lycopersicum             | ознака не визначалась | 0 |

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Маса товарного плоду 100 г, період від повних сходів до початку дозрівання 65 діб, період плодоношення 54 доби, вміст сухої речовини в плоді 5%, вміст загального цукру 5%, вміст каротину 1,3 мг%, загальна кислотність 0,4%.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:**

Закритий ґрунт.