

Вид: Редька посівна (редиска) *Raphanus sativus* L. var. *sativus*

Заявка №: 14118004 **Назва сорту:** Арлі

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритет

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

22.07.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 151000

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Плоідність	диплоїд	2
2	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотіля	відсутнє	1
3	Сім'ядолі: за розміром	середні	5
4	Листкова розетка: за шириною зростання біля основи	середня	5
5	Листок: положення у просторі	висхідне	1
6	Листок: за довжиною	довгий	7
7	Листкова пластинка: за формою	оберненояйцевидна	3
8	Листкова пластинка: форма верхівки	округла	2
9	Листкова пластинка: відтінок зеленого кольору	відсутній	1
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого кольору	сильна	7
11	Листкова пластинка: кількість лопатей	дуже мало	1
12	Листкова пластинка: надрізи країв	наявні	9
13	Листкова пластинка: глибина розрізів краю	неглибокі	3
14	Листкова пластинка: опушення	слабке	3
15	Черешок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
16	Черешок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
17	Коренеплід: за товщиною, см	середній	5
18	Коренеплід: товщина головного кореня	тонкий	3
19	Коренеплід: за формою	округлий	2
20	Коренеплід: форма верхівки	ознака не визначалась	0
21	Коренеплід: форма основи	округла	4
22	Коренеплід: забарвлення шкірки	однокольорове	1
23	Коренеплід: забарвлення верхньої частини	червоне	3
24	Коренеплід: характер виявлення червоного кольору у верхній частині	багряний	2
25	Лише для двокольорових сортів. Коренеплід: розмір білої верхівки	ознака не визначається	0
26	Коренеплід: товщина кори	тонка	3
27	Коренеплід: забарвлення м'якоті	матове біле	2
28	Час досягання	середній	5
29	Коренеплід: здатність до утворення дупла	відсутня або дуже слабка	1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність 45 т/га, середня маса плоду 60 г, тривалість періоду до досягання 29 діб, вміст сухої речовини 5%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Закритий ґрунт.