

Вид: Салат посівний головчастий *Lactuca sativa* var. *capitata* L.

Заявка №: 14421001 **Назва сорту** Енсамбл

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритет

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

18.09.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 151022

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насінина: забарвлення	чорне	3
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
3	Сіянець: розмір сім'ядолей (цілком розвинені)	маленькі	3
4	Сіянець: форма сім'ядолей	еліптична	5
5	Листок: за положенням	напівпрямостоячий	3
6	Листкова пластинка: за розсіченістю краю	нерозсічена	1
7	Рослина: діаметр	середній	5
8	Рослина: утворення головки	закрита головка	3
9	Тільки сорти із закритою головкою. Головка: ступінь перекриття верхньої частини листків	сильна	7
10	Головка: за щільністю	дуже щільна	9
11	Головка: за розміром	середня	5
12	Лише для сортів маслянистогоголовчастого типу. Головка: закриття основи	ознака не визначається	0
13	Головка: форма у поздовжньому розрізі	широкоеліптична	3
14	Листок: за товщиною	товстий	7
15	Листок: положення за збиральною стиглості (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листкового і стеблового салату)	горизонтальне	5
16	Листок: за формою	обернено-широкоеліптичний	5
17	Листок: форма верхівки	гостра	1
18	Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків	сіруватий	3
19	Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків	темне	7
20	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
24	Листок: глянсуватість з верхнього боку	слабка	3
25	Листок: пухирчастість	помірна	5
26	Листок: пухирі за розміром	середні	5
27	Листкова пластинка: хвилястість краю	помірна	5
28	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки	наявні	9
29	Листкова пластинка: глибина розсіченості краю верхівки	помірні	5
30	Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки	помірна	5
31	Тільки сорти з сильною розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип розсіченості	зубчаста	2
32	Листкова пластинка: жилкування	віялоподібне	2
33	Пазушне гілкування	відсутнє або дуже слабке	1
34	Час збиральної стиглості	середній	5
35	Час початку появи квітконоса	дуже пізній	9
36	Рослина: за висотою (квітуча рослина)	ознака не визначалась	0
37	Рослина: фасціація (під час цвітіння)	відсутня	1
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час цвітіння)	ознака не визначалась	0
39	Стійкість до борошнистої роси (<i>Bremia lactucae</i>)	наявна	9

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність 32 т/га, середня маса плоду 450 г, щільність головки 5 балів, тривалість періоду до досягання 50 діб, лежкість 60%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Закритий ґрунт.