

Вид: Цибуля городня Allium sera L.

Заявка №: 13106004 Назва сорту Бірненфурмах

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритет

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

31.03.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 150720

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|------|--|-----------------------------|-----|
| 1 | Рослина: кількість листків на псевдостеблі | середня кількість | 5 |
| 2 | Листя: положення | від прямого до напівпрямого | 2 |
| 3 | Листя: восковий наліт | слабкий | 3 |
| 4 | Листя: інтенсивність зеленого забарвлення | помірне | 5 |
| 5 | Листя: зігнутість | сильна | 3 |
| 6,1 | Тільки цибулеві сорти. Листок: за довжиною | середній | 5 |
| 6,2 | Тільки сорти шалот. Листок: за довжиною | ознака не визначається | 0 |
| 7,1 | Тільки цибулеві сорти. Листок: діаметр | середній | 5 |
| 7,2 | Тільки сорти шалот. Листок: діаметр | ознака не визначається | 0 |
| 8 | Тільки цибулеві сорти. Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка) | довге | 7 |
| 9 | Тільки цибулеві сорти. Несправжнє стебло: діаметр (посередині довжини) | середній | 5 |
| 10 | Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини) | відсутня або дуже слабка | 1 |
| 11 | Цибулина: ступінь розщеплення на цибулинки (із сухою шкіркою навколо кожної цибулини) | відсутнє або дуже слабке | 1 |
| 12,1 | Тільки цибулеві сорти. Цибулина: за розміром | мала | 3 |
| 12,2 | Тільки сорти шалот. Цибулина: за розміром | ознака не визначається | 0 |
| 13,1 | Тільки цибулеві сорти. Цибулина: за висотою | коротка | 3 |
| 13,2 | Тільки сорти шалот. Цибулина: за висотою | ознака не визначається | 0 |
| 14,1 | Тільки цибулеві сорти. Цибулина: діаметр | малий | 3 |
| 14,2 | Тільки сорти шалот. Цибулина: діаметр | ознака не визначається | 0 |
| 15,1 | Тільки цибулеві сорти. Цибулина: відношення висоти до діаметра | мале | 3 |
| 15,2 | Тільки сорти шалот. Цибулина: відношення висота / діаметр | ознака не визначається | 0 |
| 16 | Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра | біля основи | 3 |
| 17 | Цибулина/цибулінка: ширина шийки | вузька | 3 |
| 18 | Цибулина/ цибулінка: форма (у поздовжньому розрізі) | яйцевидна | 2 |
| 19 | Тільки цибулеві сорти. Цибулина: форма верхівки стебла (як для 18) | злегка спадаюча | 5 |
| 20 | Цибулина/цибулінка: форма основи (як для 18) | плеската | 2 |
| 21 | Цибулина/цибулінка: міцність тримання сухої шкірки після збирання | помірна | 5 |
| 22 | Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки | тонка | 3 |
| 23 | Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки | жовтий | 4 |
| 24 | За винятком сортів з білою сухою шкіркою. Цибулина/цибулінка: інтенсивність основного забарвлення сухої шкірки | помірне | 5 |
| 25 | Цибулина/цибулінка: відтінок забарвлення сухої шкірки | жовтуватий | 4 |
| 26 | Цибулина/цибулінка: забарвлення соковитих лусок | зеленувате | 2 |
| 27 | Цибулина/цибулінка: кількість точок зростання на кг | мало | 3 |
| 28 | Цибулина/цибулінка: вміст сухої речовини | середній | 5 |
| 29 | Тільки цибулеві сорти. Тенденція до стрілкування за весняної сівби | відсутня або дуже слабка | 1 |
| 30 | Тільки цибулеві сорти. Час стрілкування за весняної сівби | ознака не визначається | 0 |
| 31 | Тільки цибулеві сорти. Тенденція до стрілкування за сівби восени | ознака не визначається | 0 |
| 32 | Тільки цибулеві сорти. Час стрілкування за сівби восени | ознака не визначається | 0 |
| 33 | Тільки цибулеві сорти. Час збиральної стиглості за сівби восени (листя обпало на 80% рослин) | ознака не визначається | 0 |
| 34,1 | Тільки цибулеві сорти. Час збиральної стиглості за весняної сівби (як для 33) | ранній | 3 |
| 34,2 | Тільки сорти шалот. Час збиральної стиглості (як для 33) | ознака не визначається | 0 |
| 35 | Час проростання за зберігання цибулин | ранній | 3 |
| 36 | Чоловіча стерильність | відсутня або дуже низька | 1 |

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність 30 т/га, товарна урожайність 28 т/га, тривалість вегетації рослин 140 діб, вміст сухої речовини 12%, вміст загального цукру 6%, вміст вітаміну С 8мг%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ